

43); 1 особь 12 апреля в разреженном сосняке на пушицево-сфагновом болоте кв. 59, здесь же 16 июня взрослая особь с 1 молодой особью; одна особь 14 и 27 апреля в сосняке на пушицево-сфагновом болоте кв. 96, здесь же 10 июня взрослая особь с 3 молодыми; пара с 3 молодыми, выпрашивавшими корм, 14 июня в березняке ур. Мальцевское Стойло (кв. 48); выводок из 4 молодых особей 16 июня в сосняке на пушицево-сфагновом болоте кв. 29; одна особь 1 ноября на зарастающем лугу кв. 73. Одиночная (вероятно, бродячая) особь отмечена в третьей декаде мая на пойменном лугу у северной окраины д. Чухраи (кв. 2 СПК "Краснослободский", Палько И.В.).

Материал для настоящего сообщения собран в рамках работ по целевой областной программе "Мониторинг объектов животного и растительного мира, внесенных в Красную книгу Брянской области" и программе "Летопись природы", осуществляемой государственным природным биосферным заповедником "Брянский лес".

В статье применены следующие сокращения: ООО – общество с ограниченной ответственностью, СПК – сельскохозяйственный производственный кооператив, ТНВ – товарищество на вере.

РЕДКИЕ ВИДЫ ПТИЦ НА ВЕСЕННЕМ ПЕРЕЛЕТЕ В ПОЙМЕ ДЕСНЫ

С. А. КРУГЛИКОВ, О. С. ГОРЕНКОВ

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

Пойма Десны – природный комплекс, имеющий большое значение для сохранения многих видов птиц, гнездящихся и останавливающихся здесь во время весенних миграций.

Весной 2004 года нами проведены количественные учеты водоплавающих, околоводных и некоторых других групп птиц на территории заказника «Будимирская пойма». Этот заказник расположен в пойме Десны на территории Трубчевского района и входит в состав биосферного резервата «Неруссо-Деснянское По-

лесье» и ключевой орнитологической территории России, имеющей международное значение (Косенко, Кайгородова, 2000).

Стационарный пункт наблюдений в пределах заказника «Будимирская пойма» был расположен на высоком песчаном бугре (урочище Будимирское Тырло) посреди обширной низкой поймы р. Десны и ее правого рукава р. Быстник, в окр. д. Будимир. Площадь не затопливаемой части бугра, при среднем весеннем уровне воды составляла около 5 га.

Наблюдения проводили ежедневно с 25 марта по 27 апреля по методике Э. Кумари (Кумари, 1979) с некоторыми изменениями. Перелетных птиц регистрировали в течение 3-х утренних часов (начало наблюдений - за полчаса до восхода солнца) и 2-х вечерних часов (конец наблюдений - с заходом солнца).

Птиц учитывали в зоне видимости (полоса наблюдений около 3 км) с использованием бинокля (10-и кратного увеличения). Дополнительно определяли видовой состав птиц на воде с помощью подзорной трубы (30-и и 60-и кратного увеличения). Всего за 34 дня выполнено 170 часов наблюдений с помощью бинокля и около 15 часов с подзорной трубой.

Общие результаты учетов птиц (фоновых и редких) за период наблюдений приводятся в таблице.

Особенности весенней миграции редких видов

***Большая белая цапля.** Встречалась в период наблюдений равномерно небольшими стайками и единичными особями. Всего отмечено 71 птица. Первая встреча отмечена 25 марта, последняя – 25 апреля. Максимальное количество птиц в стаях 6 и 9 особей наблюдали 8 апреля и 13 апреля соответственно. Примерно с середины апреля большинство встреч относилось, по-видимому, к суточным миграциям птиц.

****Черный аист.** Встречался редко. Всего отмечено 3 птицы: 24 апреля наблюдали 2 особи, 25 апреля - 1 особь.

***Гуси, не определены до вида** (вероятно серый гусь). 10-15 апреля наблюдали с близкого расстояния три небольшие стаи (всего около 25 особей). Птицы размером с гуменника, но значительно светлее по окраске и без белого пятна на лбу. В полосе наших наблюдений эти гуси пролетели транзитом.

***Лебедь-шипун.** Встречался редко. Всего отмечено 4 птицы. 17 апреля наблюдали 2 лебедя-шипуна, которые сидели на воде, что дало возможность наблюдать

их рассмотреть с помощью подзорной трубы. 29 марта наблюдали 2 лебедя в полете (вероятно - шипуны).

***Обыкновенный осоед.** Встречался редко. Всего отмечено 3 птицы. Оди-
ночных особей наблюдали 4, 13 и 18 апреля.

***Луговой лунь.** Встречался редко. Всего отмечено 3 птицы. Оди-
ночных особей наблюдали 26 марта, 7 и 8 апреля.

****Змееяд.** Встречался редко. Одиночную особь наблюдали 5 апреля.

****Большой подорлик.** Встречался редко. Всего отмечено 4 птицы. Оди-
ночных особей наблюдали 29 марта и 18 апреля, двух подорликов - 7 апреля. 2
особи.

****Беркут.** Встречался редко. Одиночную особь наблюдали 13 апреля.

****Орлан-белохвост.** Встречался редко. Всего отмечено 3 птицы. Оди-
ночных особей наблюдали 1, 17 и 25 апреля.

***Кобчик.** Встречался редко. Всего отмечено 2 птицы. Оди-
ночных особей наблюдали 27 марта и 24 апреля.

***Обыкновенная пустельга.** Встречалась редко. Всего отмечено 3 птицы.
Одиночную особь наблюдали 5 апреля, двух птиц - 20 апреля.

***Серый журавль.** Встречался в учетном году в непривычно малом числе.
Отмечено всего 35 птиц. Журавли летели с 29 марта по 17 апреля небольшими
стайками, по 2-3 особи. Более многочисленные стаи 8 и 10 особей отмечены 10 и
21 апреля соответственно.

****Кулик-сорока.** Встречался редко. Всего отмечено 7 птиц. Оди-
ночных особей наблюдали 8, 19 и 27 апреля, малочисленную стайку из 4-х куликов - 26
апреля.

***Турухтан.** Доминирующий среди перелетных куликов вид. Всего отме-
чено свыше 10 тысяч птиц, как транзитных, так и останавливающихся для кор-
межки и отдыха. В Красной книге Брянской области занесена только гнездящаяся
популяция этого вида, о численности которой нельзя делать выводы, исходя из
результатов наших наблюдений. Отметим только, что с 23 по 27 апреля вблизи
пункта наблюдений отмечены полеты нескольких отдельных пар турухтанов, что,
возможно, связано с освоением гнездовых территорий.

Видовой состав и численность водоплавающих, околоводных и некоторых других групп птиц на весеннем перелете

Вид	Встречаемость	Примечания
Черношейная поганка – <i>Podiceps nigricollis</i>	довольно часто	десятки экз.
Чомга – <i>Podiceps cristatus</i>	довольно часто	десятки экз.
Большой баклан – <i>Phalacrocorax carbo</i>	редко	22 экз.
Выпь – <i>Botaurus stellaris</i>	довольно часто	по звуку
*Большая белая цапля – <i>Egretta alba</i>	довольно часто	десятки экз.
Серая цапля – <i>Ardea cinerea</i>	доминирует	253 экз.
Белый аист – <i>Ciconia ciconia</i>	доминирует	32 экз.
**Черный аист – <i>Ciconia nigra</i>	редко	единично
*Гуси, не определены до вида (вероятно, серый гусь) – <i>Anser</i> sp.	редко	десятки экз.
Белолобый гусь – <i>Anser albifrons</i>	доминирует	тысячи экз.
Гуменник – <i>Anser fabalis</i>	довольно часто	тысячи экз.
*Лебедь-шипун – <i>Cygnus olor</i>	редко	единично
Лебеди, не определены до вида	редко	единично
Кряква – <i>Anas platyrhynchos</i>	довольно часто	сотни экз.
Чирок-свистунок – <i>Anas crecca</i>	довольно часто	сотни экз.
Чирок-трескунок – <i>Anas querquedula</i>	довольно часто	сотни экз.
Серая утка – <i>Anas strepera</i>	редко	десятки экз.
Свиязь – <i>Anas penelope</i>	доминирует	тысячи экз.
Шилохвость – <i>Anas acuta</i>	доминирует	тысячи экз.
Широконоска – <i>Anas clypeata</i>	доминирует	тысячи экз.
Красноголовый нырок – <i>Aythya ferina</i>	довольно часто	сотни экз.
Ныrkовые утки, не опр. до вида	редко	до 10 экз.
Хохлатая чернеть – <i>Aythya fuligula</i>	довольно часто	сотни экз.
Морская чернеть – <i>Aythya marila</i>	довольно часто	сотни экз.
Обыкновенный гоголь – <i>Bucephala clangula</i>	довольно часто	десятки экз. - 25.03-08.04
Луток – <i>Mergus albellus</i>	редко	3 экз.-29.05
Большой крохаль – <i>Mergus merganser</i>	редко	7 экз.-27.04
*Обыкновенный осоед – <i>Pernis apivorus</i>	редко	единично
Черный коршун – <i>Milvus nigrans</i>	редко	7 экз. с 30.05 по 12.04
*Луговой лунь – <i>Circus pygargus</i>	редко	единично
**Змееяд – <i>Circaetus gallicus</i>	редко	единично
**Большой подорлик – <i>Aquila clanga</i>	редко	единично
**Беркут – <i>Aquila chrysaetos</i>	редко	единично
**Орлан-белохвост – <i>Haliaeetus albicilla</i>	редко	единично
Чеглок – <i>Falco subbuteo</i>	редко	2 экз.- 31.05 13.04
*Кобчик – <i>Falco vespertinus</i>	редко	единично
*Обыкновенная пустельга – <i>Falco tinnunculus</i> .	редко	единично
*Серый журавль – <i>Grus grus</i>	редко	десятки экз.

Вид	Встречаемость	Примечания
Коростель – <i>Crex crex</i>	довольно часто	по звуку
Лысуха – <i>Fulica atra</i>	довольно часто	десятки экз.
Чибис – <i>Vanellus vanellus</i>	доминирует	тысячи экз.
**Кулик-сорока – <i>Haematopus ostralegus</i>	редко	единично
Черныш – <i>Tringa ochropus</i>	довольно часто	десятки экз.
Травник – <i>Tringa totanus</i>	довольно часто	десятки экз.
*Турухтан – <i>Philomachus pugnax</i>	доминирует	тысячи экз.
Бекас – <i>Gallinago gallinago</i>	довольно часто	десятки экз.
**Большой кроншнеп – <i>Numenius arquata</i>	редко	десятки экз.
*Большой веретенник – <i>Limosa limosa</i>	доминирует	тысячи экз.
Мелкие кулики, не определены до вида	довольно часто	сотни экз.
Озерная чайка – <i>Larus ribibundus</i>	доминирует	десятки тысяч экз.
Сизая чайка – <i>Larus canus</i>	довольно часто	тысячи экз.
Хохотунья – <i>Larus cachinnans</i>	редко	18 экз.-25.03-25.04
Речная крачка – <i>Sterna hirundo</i>	доминирует	сотни экз.

Условные обозначения: ** - занесен в Красные книги России и Брянской области, *- занесен в Красную книгу Брянской области.

****Большой кроншнеп.** Встречался сравнительно редко. Всего отмечено 35 птиц. Малочисленные стайки (2-3 птицы) и одиночных особей наблюдали 11, 16, 19 и 24 апреля. Стаи из 20 и 9 особей отмечены 18 апреля и 21 апреля соответственно.

***Большой веретенник.** Один из доминирующих среди перелетных куликов видов. Всего отмечено около 7 тысяч птиц, как транзитных, так и останавливающихся для кормежки и отдыха. Первая встреча одиночных особей отмечена 25 марта. Максимум пролета многочисленных стай (из 100-150 особей в стае) зарегистрирован с 19 по 24 апреля. При завершении учета (27 апреля) перелет вида еще не был завершён.

Выводы

За время учета весной 2004 года отмечено 17 видов птиц, имеющих федеральный или региональный охранный статус. В их числе 7 видов птиц, занесенных в Красные книги России и Брянской области и 10 видов в Красную книгу Брянской области.

Наиболее многочисленными на пролете среди таких видов были турухтан и большой веретенник. В заметном количестве отмечены большая белая цапля, серый журавль и большой кроншнеп. Остальные редкие виды встречались, как правило, единично.

Среди отмеченных нами видов птиц, не имеющих охранного статуса, в наименьшем количестве зарегистрированы серая утка, большой баклан, большой крохаль и луток.

Косенко С. М., Кайгородова Е. Ю. Брянская область // Ключевые орнитологические территории России. Том 1. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России. М., 2000. С. 260-273.

Красная книга Брянской области (Животные). Брянск, 2004. 255 с.

Красная книга Российской Федерации (Животные). М., 2001. 860 с.

Кумари Э. Методика изучения видимых миграций птиц. В помощь наблюдателям природы № 76. Тарту, 1979. 58 с.

СВЕДЕНИЯ О РЕДКИХ И ОХРАНЯЕМЫХ ВИДАХ ПТИЦ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2005 ГОДУ

Ю. П. ФЕДОТОВ

Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

В статье приводятся сведения о редких и охраняемых видах птиц отмеченных в 2005 г. Исследования проводились по программе ведения Красной книги Брянской области.

Малая поганка *Podiceps ruficollis*. Редкий вид, нуждающийся в особом внимании за состоянием популяции в природной среде. В Клинцовском районе 15.05.05 г. отмечено 16 особей на водоеме к юго-западу от с. Ущерпье (затопленный польдер в пойме р. Ипуть).

Большой баклан *Phalacrocorax carbo*. Редкий и уязвимый вид, нуждающийся в особом внимании за состоянием популяции в природной среде. В Красnogорском районе 15.05.05 г. найдена гнездовая колония бакланов: 27 жилых гнезд на водоеме между селами Городечня и Великоудебное. Общее число взрослых бакланов в мае-июле на водоемах затопленного торфяника в окрестностях сел Городечня, Великоудебное и Яновка оценивается в пределах 100-120 особей.