

## БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Сообщества.** Старый сосновый лес [1, 3], черноольшаник с елью [2].

**Численность и тенденции ее изменения.** В обл. известно 2 местонахождения. В Белобережском л-ве местонахождение было представлено тремя группами особей [2].

**Лимитирующие факторы.** Уязвимый вид на границе ареала. Осушительная мелиорация. Вырубки старых сосняков и черноольшаников с елью.

**Принятые меры охраны.** Территориальная охрана отсутствует.

**Рекомендации по сохранению.** Организация ботанического памятника природы в Белобережском л-ве. Поиск новых местообитаний вида в пределах Брянского и Выгоничского лесхозов и организация их охраны.

**Источники информации:** 1. Босек, 1975; 2. Босек, 1989; 3. Сукачев, 1908; 4. Троицкий, 1947; 5. Хитрово, 1910.

**Рисунок:** Губанов и др., 2002.

**Автор:** О.И. Евстигнеев.


## ГОЛОКУЧНИК РОБЕРТОВ

*Gymnosarpium robertianum* (Hoffm.) Newm.

**Семейство** Щитовниковые —  
*Dryopteridaceae*

**Статус.** 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.


**Описание.** Травянистый длиннокорневицный многолетник. Высота — от 10 до 45 см. Матово-коричневое корневище ползучее, толстое, ветвистое, покрытое светло-коричневыми широкояйцевидными чешуями. Темно-зеленые листья одиночные, в очертании треугольные, прямо-



стоячие, триждыраздельные, с дваждынеристой пластинкой. Сегменты третьего порядка яйцевидные или продолговато-яйцевидные, тупые, городчатые.

**Биология и экология.** Споры созревают в июне—июле. Размножается корневищами и спорами. Обитает в условиях от сухолесолугового до сыролесолугового типов увлажнений. Растет на слабокислых — слабощелочных почвах с очень бедным и богатым содержанием минерального азота. Диапазон освещенности — от полуоткрытых пространств до особо тенистых лесов. Криптофит (геофит).

**Распространение.** Ср. В-Темр. В Брянской обл. — на южной границе ареала. Отмечен в 1 р-не. Погарский р-н: обрыв



## РАСТЕНИЯ

в 1,5 км от д. Марковск ниже по долине р. Судость. Обнаружение здесь этого вида — не только новость для флоры Брянской обл., но и единственное местонахождение между известняками Днестра и Крымских гор, с одной стороны, и известняками Тульской и Липецкой обл. — с другой [1].

**Ландшафты.** Погарский фг. р-н: карбонатный склон коренного берега р. Судость.

**Сообщества.** Разреженная травяная растительность крутого склона [1].

**Численность и тенденции ее изменения.** В обл. известно 1 местонахождение. Информация о состоянии популяции отсутствует.

**Лимитирующие факторы.** Уязвимый вид на границе ареала. Ограничность специфического субстрата, который необходим для существования популяций этого вида.

**Принятые меры охраны.** Территориальная охрана: памятник природы «Марковские Горы».

**Рекомендации по сохранению.** Соблюдение режима памятника природы «Марковские Горы»: запрещение добычи известняка и мела, а также палов травы. Контроль состояния популяции на ООПТ. Поиск новых местообитаний вида и обязательная их охрана.

**Источники информации:** 1. Скворцов, 1982.


**Рисунок:** Губанов и др., 2002.

**Автор:** О.И. Евстигнеев.

### ФЕГОПТЕРИС СВЯЗЫВАЮЩИЙ

*Rhegopteris connectilis* (Michx.) Watt

**Семейство** Телиптерисовые —  
*Thelypteridaceae*



**Статус.** 2-я категория. Редкий, сокращающийся в численности вид.

**Описание.** Травянистый длиннокорневицкий многолетник. Высота — до 30 см. Листья яйцевидно-треугольные, с заостренным концом и волосистым черешком, перисторассечеными сегментами. Нижняя пара сегментов отклонена вниз.

**Биология и экология.** Споры созревают летом. Размножается спорами и корневищами. Обитает в условиях от сухолесолугового до болотно-лесолугового типов увлажнений. Растет на кислых почвах с бедным и богатым содержанием минерального азота. Диапазон освещенности — от полуоткрытых до особо темных лесов. Криптофит (геофит).

**Распространение.** Ср. В-Темр. В Брянской обл. — на южной границе ареала. Отмечен в 12 р-нах. Брянский р-н: 1,5 км юго-восточнее ст. Батагово [14]; Карабичевско-Крыловское л-во [6]. Дятьковский р-н: 3,0 км восточнее ст. Верещовка [11]; 3,0 км западнее л. Латышовка [12, 13]; Бытошское л-во — кв. 13 [1, 2]; Знеборское л-во — кв. 23 [14]; Ивотское л-во — кв. 79 [1]; Старское л-во — кв. 66 [14]. Карабинский р-н: отмечался В.Н. Хитрово в окр. пгт Пальцо [13]. Клет-