

40; Вздруженское л-во — кв. 24, 25, 31, 43; Гаваньское л-во — кв. 42, 71; Ключовенское л-во — кв. 58; Кукуевское л-во — кв. 1, 4, 7, 14, 54, 55; Салтановское л-во — кв. 22, 26, 29, 30, 46; Сидоровское л-во — кв. 43, 61, 71, 75; Щегловское л-во — кв. 25, 26, 28 [19]; окр. пос. Гавань [7]. Почепский р-н: 1,0 км южнее пос. Рамасуха; левый берег р. Судость напротив д. Песчанка [7]; Семейское л-во — кв. 12, 27, 30 [5]. Рогнединский р-н: севернее д. Щипонь в оврагах коренного берега р. Десна [11]. Севский р-н: 1,0 и 2,0 км северо-восточнее пос. Зеленин [19]; окр. с. Первомайское; Подыотовское л-во; Хинельское л-во — кв. 31, 36, 39, 44, 45 [2, 5]. Стародубский р-н: около г. Стародуба [12, 13]; Стародубское л-во — кв. 8, 48 [2, 4]. Суземский р-н: 2,0 км северо-восточнее ст. Нерусса [8]; заповедник — 116 [19]; Кокоревское л-во — кв. 50, 68, 72 [2, 5, 19]; Негинское л-во — кв. 9, 10, 25, 57; Погощенское л-во — кв. 45; Стекланское л-во — кв. 44; Холмечское л-во — кв. 42, 44, 56, 75 [19]. Суражский р-н: окр. с. Лопазны [15]. Трубчевский р-н: заповедник — кв. 1, 5, 6, 12, 13, 16, 19, 21, 28-30, 32, 35, 37-40, 46, 47, 51, 57, 61, 64, 79, 98, 100, 119, 120; Скрипкинское л-во — кв. 10, 11, 20 [10, 17-20]. Унечский р-н: Рассухское л-во — кв. 50 [5].

Ландшафты. Болва-Деснянский, Брасовский, Ветьма-Деснянский, Зерново-Севский, Злынковский, Клиновско-Новозыбковский, Комаричско-Севский, Навля-Деснянский, Неруссо-Деснянский, Ревна-Деснянский, Снежеть-Деснянский, Сновский, Судостьский и Унеча-Ипутский фг. р-ны: преимущественно суглинистые и карбонатные местности, реже — супесчаные местности верхних надпойменных террас.

Сообщества. Лиственные и смешанные леса разнообразного состава.

Численность и тенденции ее изменения. В обл. известно 136 местонахождений, в том числе: в Неруссо-Деснянском фг. р-не — 66, в заповеднике — 29. Популяции представлены обычно небольшим числом особей.

Лимитирующие факторы. Вырубка лесов. Потенциально уязвимый вид из-за особенностей биологии.

Принятые меры охраны. Приложение II Конвенции СИТЕС [14]. Территориальная охрана: заповедник «Брянский лес», его охранный зона, заказники «Болото Рыжуха», «Княжна» и «Карачижско-Крыловский», памятники природы «Зеленская дача» и «Теребушка».

Рекомендации по сохранению. Охрана старовозрастных лесов. Контроль состояния популяций на территории заповедника.

Источники информации: 1. Босек, 1985; 2. Булохов, 1991 а; 3. Булохов, 1991 б; 4. Булохов, 1991 в; 5. Булохов, 1991 г; 6. Булохов, 1991 ж; 7. Гербарий Харитонцева, БГОКМ; 8. Горнов, устн. сообщ., 2004; 9. Гроздов, 1961 а; 10. Евстигнеев, Федотов, 2000; 11. Панасенко, устн. сообщ., 2003; 12. Рогович, 1855; 13. Рогович, 1869; 14. Список ..., 1998; 15. Спрыгин, 1913; 16. Татаренко, 1996; 17. Федотов, Евстигнеев, 1997; 18. Федотов, Евстигнеев, 1999; 19. Данные автора очерка; 20. Гербарий заповедника «Брянский лес»; 21. Пригаров, устн. сообщ., 2002.

Рисунок: Жизнь растений, 1982.

Автор: О.И. Евстигнеев.

ГУДАЙЕРА ПОЛЗУЧАЯ

Goodyera repens (L.) R. Br.

Семейство Орхидные — *Orchidaceae*


Статус. 3-я категория. Редкий вид.



Описание. Вечнозеленый травянистый ползучекорневищный многолетник. Высота — до 25 см. Листья прикорневой розетки яйцевидные или эллиптические, длиной до 3,5 см, с хорошо заметной сетью беловатых жилок. Стеблевые листья мелкие, линейно-ланцетные. Соцветие — однобокий колос длиной 4—7 см с мелкими желтовато-белыми цветками. Плод — коробочка с очень мелкими семенами.

Биология и экология. Цветет в июне—июле. Размножается семенами и вегетативно — корневищами. Семена прорастают при наличии грибов-симбионтов из рода *Rhizoctonia*. При сильном затенении переходит к подземному образу жизни. Первые 2—4 года растение развивается в почве, на 5-й год появляются зеленые листья. Листья зимуют, отмирая весной или через год [6]. Опыляется насекомыми. Обитает в условиях от сухолесолугового до сыролесолугового типов увлажнений. Растет на очень кислых — слабощелочных почвах с бедным содержанием минерального азота. Диапазон освещенности — от полуоткрытых пространств до особо тенистых лесов. Гемикриптофит, криптофит (геофит).

Распространение. Ср. В-Тепр. В Брянской обл. — на южной границе ареала. Отмечен в 10 р-нах. Брянский р-н: 3,0 км западнее, 3,0 км юго-восточнее и 4,0 км северо-восточнее с. Журиновичи [26];



3,0 км севернее пос. Житные Поляны [8, 23]; 3,0 км юго-восточнее ст. Батагово; Белобережское л-во — кв. 113 [26]; Карачижско-Крыловское л-во [11, 13, 20]; окр. пос. Орловские Дворики [10]; правый берег р. Снежеть напротив пгт Белые Берега [24]; окр. пгт Свень [20]. Дятьковский р-н: Дятьковское л-во — кв. 25, 31, 69, 91, 96, 100 [3, 4, 26]; Знеберское л-во — кв. 8; Кленовское л-во — кв. 46, 60 [3]; окр. д. Верецовка [8, 9, 23]; Старское л-во — кв. 50 [26]. Комаричский р-н: Луганское л-во — кв. 81 [12, 21]. Навлинский р-н: Гаваньское л-во — кв. 71 [26]; окр. пос. Гавань; окр. с. Пролысово; окр. с. Ревны [9]. Суземский р-н: заповедник — кв. 117; Краснослободское л-во — 17, 44 [12, 21, 22]. Суражский р-н: окр. г. Суража [14, 16, 17, 25]. Трубчевский р-н: Жеренское л-во — кв. 47; заповедник — кв. 1, 5, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 33, 40, 43, 76, 78, 83, 88, 100; Остролукское л-во — кв. 53—55, 65; Сольское л-во — кв. 105 [7, 12, 21, 22, 26]. Без указания конкретных местонахождений отмечался в Выгоничском, Жуковском [5] и Клетнянском [1, 2] р-нах, а также в Суражском уезде [19].

Ландшафты. Болва-Деснянский, Навля-Деснянский, Неруссо-Деснянский, Ревна-Деснянский и Снежеть-Деснян-

ский фг. р-ны: преимущественно влажные песчаные и супесчаные местности надпойменных террас и задров; реже — суглинистые моренно-задровые местности; единичные находки связаны со сфагновыми болотами. Ранее отмечался в Унеча-Ипутском фг. р-не.

Сообщества. Ельники, сосняки зеленомошные и кисличные, редко — сфагновые болота. В Неруссо-Деснянском фг. р-не вид преимущественно встречается в сосняках-зеленомошниках с примесью ели, которые относятся ассоциациям *Molinio-Pinetum Mat.* (1973) 1981 и *Peucedano-Pinetum Mat.* (1962) 1973 [15]. Здесь с гудайерой растут *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm., *Luzula pilosa* (L.) Willd., *Lycopodium annotinum* L., *Maianthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt, *Molinia caerulea* (L.) Moench, *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn, *Trientalis europaea* L., *Vaccinium myrtillus* L., *V. vitis-idaea* L. и др.

Численность и тенденции ее изменения. В обл. известно 55 местонахождений вида, в том числе в Неруссо-Деснянском фг. р-не — 25, в заповеднике — 17. Площадь отдельных популяций в Краснослободском и Остролукском л-вах достигает 1—2 га с численностью растений от 20 до 400 особей на 1 м². Значительное число обширных популяций с множеством особей отмечается на территории Дятковского л-ва. Чаще встречаются небольшие популяции с численностью растений около 10 особей. На территории заповедника большое число популяций представлены малым числом особей [26]. Современные сведения о существовании вида в Суражском р-не отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Уязвимый вид на границе ареала. Рубки лесов. Вытапывание, приводящее к иссушению почвы и препятствующее развитию грибов-симбионтов.

Принятые меры охраны. Приложение II Конвенции СИТЕС [18]. Территориальная охрана: заповедник «Брянский лес», его охранный зона, заказники «Деснянско-Жеренский» и «Трубчевский партизанский лес», памятник природы «Теребушка».

Рекомендации по сохранению. Охрана старовозрастных елово-сосновых лесов. Контроль состояния популяций на ООПТ. Поиск новых мест обитания вида и при необходимости организация их охраны.

Источники информации: 1. Босек, 1975; 2. Босек, 1982; 3. Булохов, 1991 д; 4. Булохов, 1991 ж; 5. Булохов, Величкин, 1998; 6. Вахрамеева и др., 1991; 7. Гербарий заповедника «Брянский лес»; 8. Гербарий Харитонцева, МВ; 9. Гербарий Харитонцева, БГОКМ; 10. Гроздов, 1961 а; 11. Гроздов, 1963; 12. Евстигнеев, Федотов 2000; 13. Коновалов, 1936; 14. Монтрезор, 1886; 15. Морозова, 1999; 16. Рогович, 1869; 17. Рогович, 1855; 18. Список ..., 1998; 19. Спрыгин, 1914; 20. Сукачев, 1908; 21. Федотов, Евстигнеев, 1997; 22. Федотов, Евстигнеев, 1999; 23. Харитонцев, 1986 б; 24. Хитрово, 1910; 25. Шмальгаузен, 1886; 26. Данные авторов очерка.

Рисунок: Сырейщиков, 1906.

Авторы: О.И. Евстигнеев,
Ю.П. Федотов.

ДРЕМЛИК БОЛОТНЫЙ

Epipactis palustris (L.) Crantz

Семейство Орхидные — *Orchidaceae*

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

Описание. Травянистый длиннокорневый многолетник. Высота — от 30 до 80 см. Листья длиной до 25 см, очередные, продолговатые. Соцветие — кисть из поникающих цветков. Цветки кремово-белые с грязновато-фиолетовыми полосами. Плод — коробочка.