

Ландшафты. Болва-Деснянский, Нерусса-Деснянский и Ревна-Деснянский фг. р-ны: суглинистые местности с близким залеганием карбонатных пород. Ранее был известен в Мглинском, Погарском и Стародубском фг. р-нах.

Сообщества. Влажные еловые и елово-широколиственные леса, их производные варианты. В Неруссо-Деснянском фг. р-не отмечен во влажном ельнике с осинной на границе с черноольшаником, в травяном покрове присутствуют *Carex digitata* L., *Convallaria majalis* L., *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soo, *Maianthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt, *Moneses uniflora* (L.) A. Gray, *Paris quadrifolia* L., *Pyrola rotundifolia* L., *Trientalis europaea* L., *Vaccinium vitis-idaea* L. и др. [13–15].

Численность и тенденции ее изменения. В обл. известно 10 местонахождений, в том числе в Неруссо-Деснянском фг. р-не — 1, в заповеднике — 1. В заповеднике популяция, обнаруженная в июле 1996 года, была представлена 8 цветущими особями на площади 20 м². В 1997–2000 годах надземных побегов в этой популяции не отмечено. В 2001 году был отмечен 1 цветущий побег [18]. Современные сведения о существовании вида в Погарском и Стародубском р-нах отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация [6]. Вырубка приручевых ельников. Низовые пожары.

Принятые меры охраны. Красная книга РФ [7]. Приложение II Конвенции СИТЕС [10]. Территориальная охрана: заповедник «Брянский лес», заказник «Карачижско-Крыловский».

Рекомендации по сохранению. Поиск новых мест произрастания и обязательная организация их охраны в соответствии с Законом РФ «Об охране окру-

жающей среды» (ст. 60). Наблюдение за состоянием популяций на территории ООПТ.

Источники информации: 1. Босек, 1975; 2. Босек, 1985; 3. Булохов, 1974; 4. Булохов, Величкин, 1998; 5. Евстигнеев, Федотов, 2000; 6. Красная ..., 1984; 7. Красная ..., 1988, 8. Булохов, 1991 в; 9. Монтрезор, 1891; 10. Список ..., 1998; 11. Босек ..., 1982; 12. Редкие ..., 1993; 13. Федотов, Евстигнеев, 1997; 14. Федотов, Евстигнеев, 1998; 15. Федотов, Евстигнеев, 1999; 16. Шмальгаузен, 1886; 17. Рогович, 1869; 18. Данные авторов очерка; 19. Рупрехт, 1866; 20. Рогович, 1855; 21. Гербарий заповедника «Брянский лес».

Рисунок: Сырейщиков, 1906.

Авторы: О.И. Евстигнеев,
Ю.П. Федотов.

НЕОТТИАНТА КЛОБУЧКОВАЯ

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter

Семейство Орхидные — *Orchidaceae*

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.



Описание. Травянистый вегетативный однолетник со сферическим клубнем стеблекорневого происхождения. Высота — до 40 см. Стебель тонкий ребристый, несет два сближенных при основании листа. Соцветие — рыхлая однобокая кисть. Цветки мелкие фиолетово-розовые. Плод — коробочка.

Биология и экология. Цветет в июле—августе. Размножается семенами. Образует микоризу с почвенными грибами. Обитает в условиях от влажно-степного до влажно-лесолугового типов увлажнения. Диапазон освещенности — от открытых пространств до тенистых лесов. Крптофит (геофит).

Распространение. Eu-As. Temp. В Брянской обл. отмечен в 5 р-нах. Брянский р-н:



в начале XX века найден в окр. пгт Свень; Брянское опытное л-во; Карачижско-Крыловское л-во [1, 3, 9, 17]. Навлинский р-н: 3,0 км восточнее с. Пролысово [7, 8, 16]; 3,5 км восточнее пгт Алтухово [5]; Алтуховское л-во — кв. 113 [10, 13–15]. Суземский р-н: Кокоревское л-во — кв. 29 [6, 10, 13–15]. Без указания конкретных местонахождений отмечался в Жуковском и Трубчевском р-нах [2].

Ландшафты. Болва-Деснянский, Навля-Деснянский и Нерусса-Деснянский фг.

р-ны: суглинистые местности с близким залеганием карбонатных пород. Ранее отмечался в Ревна-Деснянском фг. р-не.

Сообщества. Лиственные, хвойные и смешанные леса. В Неруссо-Деснянском фг. р-не вид найден в светлом сосняке вместе с *Angelica sylvestris* L., *Convallaria majalis* L., *Equisetum hyemale* L., *Laserpitium latifolium* L., *Lilium martagon* L., *Melica nutans* L., *Rubus saxatilis* L. и др.; в липняке, где растет с *Aegoropodium podagraria* L., *Asarum europaeum* L., *Botrychium multifidum* (S. G. Gmel.) Rupr., *Lathyrus niger* (L.) Bernh. и др. [18]; в сосняке-зеленомошнике [3].

Численность и тенденции ее изменения. В обл. с начала XX века известно 9 местонахождений, в том числе в Неруссо-Деснянском фг. р-не — 3. Популяция, найденная в 80-х годах в сосняке-зеленомошнике, была представлена 12 цветущими экземплярами и 5 — в вегетативном состоянии на площади 10 м² [4]. Две близкие популяции, отмеченные в августе 1994 года в Алтуховском и Кокоревском л-вах, были представлены единичными растениями в цветущем состоянии [18].

Лимитирующие факторы. Рубка лесов, выпас скота, сбор растений, низовые пожары.

Принятые меры охраны. Красная книга РФ [11]. Приложение II Конвенции СИТЕС [12]. Территориальная охрана: заказник «Княжна».

Рекомендации по сохранению. Наблюдение за состоянием популяций. Поиск новых мест произрастания и обязательная их охрана.

Источники информации: 1. Босек, 1975; 2. Босек, 1982; 3. Булохов, Величкин, 1998; 4. Величкин, Булохов, 1990; 5. Величкин, устн. сообщ.; 6. Гербарий заповедника «Брянский лес»; 7. Гербарий Хари-

тонцева, MW; 8. Гербарий Харитонцева, БГОКМ; 9. Гроздов, 1963; 10. Евстигнеев, Федотов, 2000; 11. Красная ..., 1988; 12. Список ..., 1998; 13. Федотов, Евстигнеев, 1997; 14. Федотов, Евстигнеев, 1998; 15. Федотов, Евстигнеев, 1999; 16. Харитонцев, 1986 б; 17. Хитрово, 1910; 18. Данные автора очерка.

Рисунок: Сырейщиков, 1906.

Автор: О.И. Евстигнеев.

ПАЛЬЧАТОКОРЕННИК БАЛТИЙСКИЙ

Dactylorhiza longifolia (L. Neum.) Aver.

Семейство Орхидные — *Orchidaceae*

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Описание. Травянистый вегетативный однолетник с пальчато-раздельным клубнем стеблекорневого происхождения. Высота — до 70 см. Стебель прямой, полый, несет 5—8 продолговато-ланцетных листьев с коричневатыми или пурпуровыми пятнышками. Верхние стеблевые листья мелкие, заостренные, их верхушки достигают основания соцветия; нижние — более крупные, длиной 10—25 см и шириной до 5 см. Максимальная

ширина листа — в средней части. Соцветие — густой многоцветковый длиннотрубчатый колос с фиолетово-пурпурными цветками [13]. Губа округло-ромбическая, трехлопастная, с темно-фиолетовыми пятнышками; боковые лопасти губы полуокруглые; средняя лопасть яйцевидно-треугольная, тупая, чуть длиннее боковых. Плод — коробочка.

Биология и экология. Цветет в июне—июле. Размножается семенами. Образует микоризу с почвенными грибами. Обитает в условиях от сухолесового до болотного типов увлажнений. Хорошо растет на кислых — слабощелочных почвах с бедным содержанием минерального азота. Диапазон освещенности — от открытых пространств до светлых лесов. Криптофит (геофит).

Распространение. Еу-Ас. В-Темр. В Брянской обл. отмечен в 11 р-нах. Брасовский р-н: юго-западная оконечность с. Холмешский Хутор [15]. Брянский р-н: Карачижско-Крыловское л-во [1, 11]. Дятьковский р-н: пойма р. Ветьма. Выгоничский р-н: окр. д. Киселевка [12]. Жуковский р-н: пойма р. Ветьма [1]. Навлинский р-н: 2,0 км севернее пгт Алтухово; Алтуховское л-во — кв. 11, 50 [2, 15]; окр. с. Пролысово [12]; урочище «Болото Рыжуха» [2, 15]. Почепский р-н: 4—5 км

