


ПОДДЕСНИК ЕВРОПЕЙСКИЙ

Sanicula europaea L.

Семейство Зонтичные — *Ariaceae*

Статус. 2-я категория. Редкий, сокращающийся в численности вид.


Описание. Травянистый кистекорневой многолетник. Высота — 20–30 см. Прикорневые листья округло-сердцевидные, длинночерешковые. Стеблевые листья, как правило, отсутствуют. Цветки собра-



ны в шаровидные 3–5-лучевые зонтички; зонтички обычно 3-лучевые. Цветки белые или розоватые. Плод — вислоплодник, покрытый крючковатыми шипиками.

Биология и экология. Цветет в июне—августе. Размножается семенами. Обитает в условиях от лугово-степного до влажно-лесолугового типов увлажнений. Растет на слабокислых — слабощелочных почвах с бедным и богатым содержанием минерального азота. Диапазон освещенности — открытые и полукрытые пространства. Гемикриптофит.

Распространение. Eu. Temp-Sm. В Брянской обл. — на восточной границе ареала. Отмечен в 12 р-нах. Брасовский р-н: Крупецкое л-во — кв. 55–58 [5, 13]. Брян-



ский р-н: Брянское опытное л-во [8]; Карачижско-Крыловское л-во [1, 10]; окр. д. Свень в пределах Ковшовского л-ва [1, 8]; роца «Соловьи» г. Брянска [6, 12, 14, 15, 21]. Выгоничский р-н: юго-западнее пос. Алексеевский [11]; окр. с. Лопушь [11]; окр. пос. Киселевка [11]. Дятьковский р-н: 2,0 км юго-восточнее г. Дятькова [16, 17]; Дятьковское л-во — кв. 96, 107; Ивотское л-во — 65 [2, 3, 20]. Злынковский р-н: Софиевское л-во [1]. Клетнянский р-н: долина р. Лутянка [7]. Навлинский р-н: 5,0 км юго-восточнее с. Пролысово [11, 16, 17]; Вздруженское л-во — кв. 25, 43; Салтановское л-во — кв. 22, 30, 46 [13]. Погарский р-н: окр. г. Погара [19]; окр. хут. Роговичи [9]; урочище «Матеевские дачи» [13]. Почепский р-н: 1,0 км южнее пос. Рамасуха [13]. Суземский р-н: Кокоревское л-во — кв. 28 [5, 22]. Суражский р-н: окр. с. Лопазны [18]. Без указания конкретных местонахождений отмечался в Новозыбковском р-не [4].

Ландшафты. Болва-Деснянский, Брянский, Злынковский, Навля-Деснянский, Неруссо-Деснянский, Погарский и Судостьский фг. р-н: суглинистые и карбонатные местности. Ранее отмечался в Клетнянском и Ревна-Деснянском фг. р-нах.

Сообщества. Лиственные и смешанные леса. В Неруссо-Деснянском и Погарском

фг. р-нах встречен в осинниках неморального состава, где растет с *Carex pilosa* Scop., *Galium odoratum* (L.) Scop., *Glechoma hederacea* L., *Pulmonaria obscura* Dumort., *Stellaria holostea* L. и др. [13]. Отмечен в сообществах ассоциации *Melico nutantis-Piceetum abietis* (Cajand. 1921) K.-Lund 1962, где растет с *Fragaria vesca* L., *Gymnocarpium dryopteris* (L.) Newm., *Luzula pilosa* (L.) Willd., *Maianthemum bifolium* (L.) F. W. Schmidt, *Melica nutans* L., *Orthilia secunda* (L.) House, *Oxalis acetosella* L., *Trientalis europaea* L., *Vaccinium myrtillus* L. и др. [20].

Численность и тенденции ее изменения.

В обл. известно 29 местонахождений, в том числе в Неруссо-Деснянском фг. р-не — 5. Популяции представлены обычно небольшим числом особей. Площадь популяции в Кокоревском л-ве — 0,5 га, плотность — от 4 до 85 особей на 1 м² [13]. Местонахождение в роще «Соловьи» (г. Брянск) представлено несколькими особями [6]. В 1912 году в окр. с. Лопазны Суражского р-на вид был представлен большим числом особей [18]. Современные сведения о существовании вида в Клетнянском и Суражском р-нах отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Уязвимый вид на границе ареала. Рубки лесов. Низовые пожары.

Принятые меры охраны. Территориальная охрана: заказник «Княжна» и «Матеевские дачи», памятник природы «Роща «Соловьи».

Рекомендации по сохранению. Поиск новых мест произрастания, организация охраны в комплексе с другими редкими видами. Контроль состояния популяций на ООПТ.

Источники информации: 1. Босек, 1975; 2. Булохов, 1974; 3. Булохов, 1991 ж; 4. Булохов, Величкин, 1998; 5. Евстигнеев, Федотов, 2000; 6. Панасенко, 2002

а; 7. Стоянов, 1921; 8. Хитрово, 1910; 9. Шмальгаузен, 1886; 10. Гербарий Гроздова, БГОКМ; 11. Гербарий Харитонцева, БГОКМ; 12. Булохов, Семенников, 2002; 13. Данные автора очерка; 14. Панасенко, 2002 б; 15. Панасенко, 2003; 16. Гербарий Харитонцева, МВ; 17. Харитонцев, 1986 б; 18. Спрыгин, 1913; 19. Рогович, 1855; 20. Булохов, 2003; 21. Пригаров, устн. сообщ., 2002; 22. Гербарий заповедника «Брянский лес».

Рисунок: Сырейщиков, 1907.

Автор: О.И. Евстигнеев.

ОДНОЦВЕТКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ

Moneses uniflora (L.) A. Gray

Семейство Грушанковые — *Pyrolaceae*

Статус. 2-я категория. Редкий, сокращающийся в численности вид.

Описание. Травянистый короткокорневищный многолетник. Высота — до 12 см. Длинное тонкое ползучее корневище расположено в подстилке. Листья округлые, кожистые, собраны при основании стебля. Цветок одиночный, крупный (до 2 см в диаметре), на безлистном цвето-

