

Рекомендации по сохранению. Организация ботанических памятников природы в окр. д. Петуховка Жуковского р-на и в окр. д. Верецовка Дятьковского р-на. Поиск новых местообитаний и при необходимости организация ООПТ. Наблюдение за состоянием популяций.

Источники информации: 1. Босек, 1975; 2. Булохов, Величкин, 1998; 3. Варлыгина, 1998 б; 4. Гербарий БГУ; 5. Гербарий Харитонцева, БГОКМ; 6. Рогович, 1869; 7. Шмальгаузен, 1886; 8. Татаренко, 1996; 9. Список ..., 1998; 10. Гербарий Харитонцева, МВ; 11. Харитонцев, 1986 б; 12. Рогович, 1855.

Рисунок: Губанов и др., 2002.

Авторы: Э.М. Величкин,
О.И. Евстигнеев.

ПЫЛЬЦЕГОЛОВНИК ДЛИННОЛИСТНЫЙ

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

Семейство Орхидные — *Orchidaceae*

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Описание. Травянистый короткокорневищный многолетник. Высота — до 60 см.



Стебель с 6—9 линейно-ланцетными заостренными листьями. Соцветие — колосовидное, состоит из 3—10 белых, направленных вверх цветков. Цветки 12—18 мм длиной, неправильные, листочки околоцветника вместе с губой колокольчато сложены. Губа разделена на 2 части. Плод — сухая веретеновидная коробочка.

Биология и экология. Цветет в мае—июле. Интенсивность вегетативного размножения невелика. Образует микоризу с почвенными грибами. Обитает в условиях от лугово-степного до влажно-лесолугового типов увлажнений. Растет на слабокислых — слабощелочных почвах с очень бедным и достаточным содержанием минерального азота. Крпифит (геофит).

Распространение. Еу-Ас. Темр-М. В Брянской обл. вид отмечен в 8 р-нах. Брянский р-н: Карачижско-Крыловское л-во [1, 2, 14]; окр. пос. Орловские Дворики [9, 19, 20]; роща «Соловьи» г. Брянска [12, 13, 17, 18, 23]. Выгоничский р-н: Краснорогское л-во [2]. Дятьковский р-н: окр. д. Пастушье [9]. Навлинский р-н: 1,0 км западнее, 1,0 км севернее и 0,5 км восточнее хут. Глубокие Лужи [15, 22]; 3,0 км восточнее с. Салтановка [15]; Ключовенское л-во — кв. 58 [10, 15]; Кукуевское л-во — кв. 7,



54 [15]; окр. пгт Навля [2, 5]; окр. с. Пролысово [2]; Сидоровское л-во — кв. 112, 113 [15]. Погарский р-н: окр. хут. Роговичи [6, 7, 11, 21]. Унечский р-н: окр. д. Шулаковка [6]. Без указания конкретных местонахождений отмечался в Комаричском и Стародубском р-нах [3].

Ландшафты. Брянский, Болва-Деснянский, Навля-Деснянский и Судостьский фг. р-ны: суглинистые местности с близким залеганием карбонатных пород.

Сообщества. Наибольшие по численности популяции отмечены в светлых дубравах, сосняках, осинниках и березняках Навля-Деснянского фг. р-на. В редком подлеске этих сообществ отмечены крушина, можжевельник, бересклет бородавчатый, рябина. В травяном ярусе представлены *Convallaria majalis* L., *Rubus saxatilis* L., *Fragaria vesca* L., *Pyrola rotundifolia* L., *Lycopodium clavatum* L., *Orthilia secunda* (L.) House, *Genista tinctoria* L., *Melica nutans* L., *Melampyrum pratense* L., *Trifolium alpestre* L. и др. [15].

Численность и тенденции ее изменения. В обл. с середины XIX века известно 20 местонахождений. Популяции в Навлинском р-не, обнаруженные в 1998–2003 годах, образуют компактный участок массового распространения вида в обл. общей площадью около 50 тыс. га. Численность особей в популяциях колеблется в широких пределах: от единичных растений до тыс. особей. Число вегетирующих растений достигает 15 особей на 1 м². Площадь, занимаемая отдельными популяциями, варьирует от нескольких м² до 2–3 га [15]. Местонахождение в роще «Соловьи» (г. Брянск) в 2002 году было представлено двумя особями [23]. Современные сведения о существовании вида в Погарском и Унечском р-нах отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Неустойчив к сбору соцветий на букеты, сенокосению, пожарам, а также вытаптыванию и выпасу; слабоустойчив к рубке леса [16]. Естественная смена светлых разреженных лесов на сообщества теневого типа.

Принятые меры охраны. Красная книга РФ [4]. Приложение II Конвенции СИТЕС [8]. Территориальная охрана: заказники «Матеевские дачи» и «Карачижско-Крыловский», памятник природы «Роща «Соловьи».

Рекомендации по сохранению. Соблюдение режима заказника «Карачижско-Крыловский»: ограничение пастьбы скота, сенокосение после цветения и плодоношения растений, запрещение сбора растения для гербария во время проведения учебных практик [20]. Организация ботанического памятника природы в Навлинском р-не. Наблюдение за состоянием популяций. Поиск новых местообитаний. Пропаганда недопустимости сбора охраняемых красивоцветущих растений.

Источники информации: 1. Босек, 1975; 2. Босек, 1982; 3. Булохов, Величкин, 1997; 4. Красная ..., 1988; 5. Хитрово, 1910; 6. Шмальгаузен, 1886; 7. Монтрезор, 1886; 8. Список ..., 1998; 9. Гербарий Харитонцева, БГОКМ; 10. Сильченко, устн. сообщ., 1998; 11. Рогович, 1869; 12. Булохов, Семенищников, 2002; 13. Панасенко, 2002 а; 14. Гроздов, 1963; 15. Федотов, Евстигнеев, 2003; 16. Татаренко, 1996; 17. Панасенко, 2002 б; 18. Панасенко, 2003; 19. Гербарий Харитонцева, МВ; 20. Харитонцев, 1986 б; 21. Рогович, 1855; 22. Гербарий заповедника «Брянский лес»; 23. Пригаров, устн. сообщ., 2002.

Рисунок: Губанов и др., 2002.

Авторы: О.И. Евстигнеев,
Ю.П. Федотов.