Численность и тенденции ее изменения. В настоящее время в обл. известно только 1 местонахождение: на р. Судость между д. Лукин и с. Чаусы. Впервые здесь болотноцветник был обнаружен А. С. Роговичем 13 августа 1849 года [1]. В августе 1936 года болотноцветник был представлен массовыми зарослями в нескольких старицах р. Судость [6]. В августе 2003 года популяция была сформирована многочисленными зарослями на участке реки между д. Лукин и с. Чаусы [10]. Популяция, обнаруженная В. Н. Хитрово [8] в начале XX века на водоемах болота Пальцо, видимо, исчезла.

Лимитирующие факторы. Осушительная мелиорация. Загрязнение водоемов.

Принятые меры охраны. Территориальная охрана отсутствует.

Рекомендации по сохранению. Организация ботанического памятника в пойме р. Судость на отрезке от д. Лукин до границы с Украиной. Контроль состояния популяций.

Источники информации: 1. Гербарий Роговича, ИБ НАН Украины; 2. Босек, 1975; 3. Монтрезор, 1887; 4. Рогович, 1855; 5. Рогович, 1869; 6. Рыбаков, 1938; 7. Скворцов, 1982; 8. Хитрово, 1925; 9. Шмальгаузен, 1886; 10. Данные авторов очерка.

Рисунок: Флора ..., 1981.

Авторы: *О.И. Евстигнеев, Ю.П. Федотов.*

ШАЛФЕЙ ПОНИКАЮЩИЙ

Salvia nutans L.

Семейство Губоцветные — *Lamiaceae*

Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Описание. Травянистый стержнекорневой многолетник. Высота — 40—80 см. Стебель безлистный (только с прицветниками), опушенный, прямой. Все листья прикорневые, длинночерешковые, яйцевидно-продолговатые, двоякогородчатые, при основании сердцевидные, морщинистые, снизу сероватопушистые. Прицветники мелкие, округлые, отогнутые. Мутовки цветков собраны в короткие густые поникающие кисти. Чашечка с пушком, по отцветании повислая, верхняя губа ее яйцевидно-округлая, сверху вогнутая, с 3 очень мелкими зубцами. Венчик около 13 мм длиной, вдвое длиннее чашечки, голубоватый (иногда чисто-белый). Плод — коробочка.

Биология и экология. Цветет в мае—июне. Размножается семенами. Обитает в условиях от сухостепного до сухолесолугового типов увлажнений. Диапазон освещенности — открытые и полуоткрытые пространства. Гемикриптофит.

Распространение. Eu. Sm. В Брянской обл. — на северной границе ареала. Отмечен только в Комаричском р-не: между д. Усожа и д. Угревище [1].

Ландшафты. Комаричско-Севский фг. р-н: обрывистый карбонатный склон правого коренного берега р. Усожа.

Сообщества. Лугово-степное сообщество, где растет с *Eryngium planum* L., *Galium tinctorium* (L.) Scop., *Lavatera thuringiaca* L., *Salvia pratensis* L., *Stachys recta* L., *Trifolium alpestre* L. и др. [1, 2].

Численность и тенденции ее изменения. В обл. известно 1 местонахождение. Популяция, обнаруженная 10 июля 1975 года, была представлена несколькими небольшими группами цветущих растений [1].

Лимитирующие факторы. Уязвимый вид на границе ареала. Весенние палы травы, разведение костров, вытаптывание, сборы растений.

Принятые меры охраны. Территориальная охрана отсутствует.

Рекомендации по сохранению. Уточнение мест произрастания в Комаричском р-не и организация ботанического памятника природы. Пропаганда недопустимости сбора охраняемых красивоцветущих растений.

Источники информации: 1. Босек, 1979; 2. Босек, 1980.

Рисунок: Красная ..., 1995.

Автор: *О.И. Евстигнеев.*

МЫТНИК СКИПЕТРОВИДНЫЙ

Pedicularis sceptrum-carolinum L.

Семейство Норичниковые — *Scrophylariaceae*

Статус. 2-я категория. Редкий, сокращающийся в численности вид.

Описание. Травянистый короткокорневищный многолетник высотой до 80 см. Большая часть листьев собрана у основания стебля в розетку; стеблевые листья немногочисленные супротивные. Листья линейно-ланцетные, суженные в черешок, перистораздельные или перисторассеченные. Соцветие — рыхлый малоцветковый верхушечный колос. Цветки крупные, 3,5—4,5 см, желтые, с лиловой нижней губой. Плод — почти шаровидная коробочка.

Биология и экология. Цветет с июня по сентябрь. Размножается исключительно семенами. Корневой полупаразит травянистых растений: органические вещества вырабатывает самостоятельно, воду с минеральными веществами получает от других растений. Умеренно теплолюбивый вид. Обитает в условиях от свежелесолугового до болотно-лесолуго-