81 [5]. Жуковский р-н: окр. д. Косилово [8]. Клетнянский р-н: долина р. Лутянка; долина р. Опороть [3]. Комаричский р-н: 2,0 км южнее д. Василек [10]. Навлинский р-н: окр. с. Пролысово [8]; Синезерское л-во — кв. 6 [10]. Почепский р-н: окр. пос. Гамалеевка [1]. Суземский р-н: 2,0 км севернее ж.-д. ст. Нерусса; окр. ж.-д. ст. 480-й км [8]. Севский р-н: 1,0 км юго-восточнее пос. Сосница; окр. д. Ивачево [9]; окр. д. Липницы [1]; окр. с. Чемлыж [8]; окр. д. Шведчики [4]. Без указания конкретных местонахождений отмечался в Погарском р-не [7].

Ландшафты. Болва-Деснянский, Ветьма-Деснянский, Зерново-Севский, Клетнянский, Клетнянский, Комаричско-Севский, Навля-Деснянский, Нерусско-Деснянский, Ревна-Деснянский, Снежеть-Деснянский и Судостьский фг. р-ны: долины малых рек и ручьев, окраины болот с богатыми влажными почвами с близким залеганием карбонатных пород.

Сообщества. Опушки елово-широколиственных и широколиственных лесов. Светлые разреженные леса с богатым травяным покровом. Суходольные и заболоченные луга.

Численность и тенденции ее изменения. В обл. известно 22 местонахождения, в том числе в Неруссо-Деснянском фг. р-не — 2. Популяции разной численности.

Лимитирующие факторы. Распашка лугов и вырубка лесов. Преобразование светлых разреженных лесов в сообщества теневого типа. Низовые пожары. Сбор соцветий в букеты.

Принятые меры охраны. Территориальная охрана: заказник «Карачижско-Крыловский».

Рекомендации по сохранению. Организация ООПТ в местах массового произрастания вида. Контроль состояния популяций. Пропаганда недопустимости сбора охраняемых красивоцветущих растений.

Источники информации: 1. Алексеев и др., 1975; 2. Босек, 1975; 3. Босек, 1982; 4. Булохов, 1991 а; 5. Булохов, 1991 б; 6. Булохов, 1991 г; 7. Булохов, Величкин, 1998; 8. Гербарий Харитонцева, БГОКМ; 9. Святский, 1905; 10. Данные автора очерка.

Рисунок: Маевский, 1964.

Автор: *О.И. Евстигнеев.*

ВЕТРЕНИЦА ДУБРАВНАЯ

Anemonoides nemorosa (L.) Holub

Семейство Лютиковые — *Ranunculaceae*

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

Описание. Травянистый короткокорневищный многолетник. Высота — 10—15 см. Стебель прямостоячий с мутовкой из трех прицветников, по форме напоминающих листья. Нижние листья и прицветник трехраздельные, пальчаторассеченные, по краю пильчатые. Цветки белые, с внешней стороны красноватые, розо-

вые или сиреневые. Цветок, как правило, один. Плод — многоорешек.

Биология и экология. Цветет в апреле—мае. Размножается семенами и вегетативно — корневищем. Эфемероид. Обитает в условиях от влажно-степного до болотно-лесолугового типов увлажнений. Растет на кислых — слабощелочных почвах с очень бедным и богатым содержанием минерального азота. Диапазон освещенности — от открытых пространств до светлых лесов. Криптофит (геофит).

Распространение. Eu-As. Temp. В Брянской обл. отмечен в 8 р-нах. Брянский р-н: 360 км трассы Москва — Киев [7]; 2,0 км западнее пос. Белые Берега; окр. с. Малое Полпино [6, 13]. Дятьковский р-н: Ивотское л-во — кв. 87, 88 [1, 2]. Злынковский р-н: Злынковское л-во — кв. 137, 138, 147; Софиевское л-во — кв. 26, 39, 58, 73 [2]. Клетнянский р-н: Клетнянское л-во — кв. 42, 87 [3, 10]; Косновское л-во — кв. 43, 44, 52 [10]; окр. ст. Акуличи [10]; Пригородное л-во — кв. 16 [15]. Трубчевский р-н: заповедник — кв. 18, 35, 46—48 [8, 11, 12]. Унечский р-н: окр. д. Шулаковка [9, 14]; Рассухское л-во — кв. 46, 62, 64; Унечское л-во — кв. 86, 146, 148 [3]. Без указания конкретных местонахождений отмечался в Жуковском и Новозыбковском р-нах [1, 4].

Ландшафты. Болва-Деснянский, Злынковский, Клетнянский, Клинцовско-Новозыбковский, Неруссо-Деснянский, Ревна-Деснянский и Унеча-Ипутьский фг. р-ны: суглинистые моренно-зандровые местности.

Сообщества. Широколиственные и хвойно-широколиственные леса, их производные варианты. А.Д. Булохов и А.И. Соломещ [5] отмечают этот вид в сообществах ассоциаций Aceri platanoides-Piceetum abietis Bulokhov et Solomeshch 2003, Mercurialo-Quercetum roboris Bulokhov et Solomeshch 1991.

Численность и тенденции ее изменения. В обл. известно 33 местонахождения, в том числе в Неруссо-Деснянском фг. р-не — 5, в заповеднике — 5. Часть популяций представлена многочисленными особями, которые содоминируют в синузии весенних эфемероидов. Большое число популяций отмечено в заповеднике [8], Злынковском, Клетнянском и Софиевском л-вах [2, 3].

Лимитирующие факторы. Замена естественных сообществ лесными культурами. Весенние палы травы. Сбор растений вблизи населенных пунктов.

Принятые меры охраны. Территориальная охрана: заповедник «Брянский лес».

Рекомендации по сохранению. Сохранение старовозрастных широколиственных лесов. Контроль состояния популяций.

Источники информации: 1. Булохов и др., 1975; 2. Булохов, 1991 б; 3. Булохов, 1991 в; 4. Булохов, Величкин, 1998; 5. Булохов, Соломещ, 2003; 6. Гербарий Харитонцева, MW; 7. Гербарий Харитонцева, БГОКМ; 8. Евстигнеев, Федотов, 2000; 9. Рогович, 1855; 10. Сто-

янов, 1921; 11. Федотов, Евстигнеев, 1997; 12. Федотов, Евстигнеев, 1999; 13. Харитонцев, 1986 б; 14. Шмальгаузен, 1886; 15. Данные автора очерка.

Рисунок: Сырейщиков, 1907.

Автор: *О.И. Евстигнеев.*

ВЕТРЕНИЦА ЛЕСНАЯ

Anemone sylvestris L.

Семейство Лютиковые — *Ranunculaceae*

Статус. 2-я категория. Редкий, сокращающийся в численности вид.

Описание. Травянистый короткокорневищный многолетник. Прикорневые листья длинночерешковые, пальчаторассеченные на 3—5 сегментов. Стебель до 40 см высотой несет одиночный цветок. Цветок до 7 см в диаметре, белый. Плод — многоорешек. Плодики (орешки) покрыты длинными густыми волосками.

Биология и экология. Цветет с мая до начала июня. Размножается семенами и вегетативно — корневыми отпрысками. От прорастания семени до цветения проходит около 5—8 лет. Обитает в условиях от сухостепного до влажно-лесолугового типов увлажнений. Растет на кислых — слабощелочных почвах с очень бедным и достаточным содержанием минерального азота. Диапазон освещенности — от открытых пространств до светлых лесов. Гемикриптофит.

Распространение. Eu-As. B-Sm. В Брянской обл. вид отмечен в 13 р-нах. Брянский р-н: Карачижско-Крыловское л-во [6]; окр. пос. Орловские Дворики [6, 14]; склон Карачижского оврага в г. Брянске [15—17]; роща «Соловьи» г. Брянска [27]. Выгоничский р-н: окр. с. Удельные Уты [8]. Комаричский р-н: 0,5 км юго-восточнее д. Усожа [22]; лог бассейнов р. Усожа и р. Причижка [2]; Луганское л-во — кв. 92 [10, 23]; урочище Печное между с. Угревище и д. Мостечня [1, 2]. Навлинский р-н: 1,5 и 2,0 км северо-восточнее с. Гололобово [9]; 4,0 км юго-западнее с. Пролысово в урочище «Сеновец» и окр. пгт Алтухово [8]. Погарский р-н: 0,5 км западнее с. Чаусы [9]; овраг в 1,5 км от д. Марковск выше по долине р. Судость; овраг, непосредственно примыкающий к юго-восточному краю д. Марковск [9, 21]; окр. д. Лукин [4]. Рогнединский р-н: окр. с. Пятницкое [7, 25]. Севский р-н: 1,0 км северо-восточнее д. Рейтаровка; 1,5 км восточнее с. Новоямское, 2,0 км северо-восточнее д. Юшино, Зеленская