

Источники информации: 1. Виноградов, Морозов, 2001; 2. Материалы анкетирования, 1985 — 2003; 3. Данные автора.

Автор: А.И. Артюхов.

ЛЕБЕДЬ-ШИПУН

Cygnus olor (Gmelin, 1789).

Отряд Гусеобразные — Anseriformes


Семейство Утиные — Anatidae

Статус. 3 категория — редкий гнездящийся вид.

Описание. Большая птица с чисто белым оперением (у молодых птиц оперение буровато-серое). Шея тонкая длинная, которую птица сгибает S-подобно, когда плавает на воде. Клюв красный с черным наростом на лбу и черным основанием. У молодых птиц клюв розовый с черным основанием и кончиком. Голос подают очень редко. При угрозе шипят. Вес 5,5 — 14,3 кг, длина 145 — 160 см, размах крыльев 208 — 238 см.

Распространение. Почти вся Западная Европа, центр и юг Восточной Европы, степи и лесостепи Предуралья, Зауралья и Западной Сибири. Отмечается постепенное расширение ареала и появление новых очагов обитания вида [3].

Распространение в Брянской области. В обл. редкий гнездящийся вид. В последние годы лебедь-шипун отмечен на гнездовании в 8 р-нах [1, 4, 6]. В Брасовском р-не пара с 5 птенцами гнездилась в 1995 г. на оз. Клинском (окр. п. Брасово). Здесь же в 1996 г. наблюдали пару с 3 птенцами. В дальнейшем птицы перестали здесь гнездиться из-за браконьерства. В Краснорском р-не 1 — 3 пары гнездились в 2000 — 2002 гг. на оз. Кожаны, Мирновском и Великоудебном вдхр. (между нп. Мирный, Яновка, Великоудебное, Увелье), а также на об-



водненных торфяных карьерах к югу от п. Красная Гора. В выводках отмечено 2 — 4 птенца. В Злынковском р-не пара лебедей гнездилась в 1989 — 90 гг. на пруду в с. Малые Щербиничи. Здесь же в 2001 г. встречена пара с 9 птенцами. В 2002 г. в этом месте 2 лебедя держались без птенцов, а в 2003 г. отмечена пара с 2 птенцами. В Навлинском р-не на пруду в окр. д. Алексеевка в 1991 г. гнездилась пара лебедей-шипун. В дальнейшем птицы перестали гнездиться из-за браконьерства. В Трубчевском р-не пара лебедей-шипун гнездилась в 1980 — 90-х гг. в междуречье Десны и Быстрика возле д. Будимир. В дальнейшем птицы перестали здесь гнездиться из-за браконьерства. О гнездовании лебедей-шипун в 1998 г. имеется сообщение из Унечского р-на. В Севском р-не на заброшенных прудах возле д. Добрунь в 1997 г. гнездилась пара с 3 — 4 птенцами. В Стародубском р-не гнездование лебедей отмечено в 1986 г. на обводненных торфяных карьерах болота Брезгуновка. Кроме гнездящихся пар на территории обл. летует небольшое число неразмножающихся птиц. Летом 2003 г. отмечено 10 — 12 кочующих лебедей-шипун в Севском р-не (Севский пруд) и Ко-



марицком р-не (пруд п. Ивановский). В Белоруссии с 1980-х гг. отмечается увеличение численности и распространения лебедя-шипуна, теперь он гнездится по всей территории республики [2]. На сопредельной территории Украины с конца 1990-х гг. отдельные пары начали поселяться на водоемах Щорского, Корюковского и Новгород-Северского р-нов Черниговской обл. [5].

Места обитания и образ жизни. Перелетная птица. Появляется в конце марта — начале апреля. Гнездится по озерам, старицам и прудам с обширными тростниковыми зарослями. Гнездо до 3 м в диаметре из тростника, рогоза и других растений располагается на тростниковых завалах, сплавине или мелководье. Кладка с середины мая, состоит из 6 — 8 (бывает до 12) больших грязновато-голубоватых яиц. Насиживает самка. Самец находится обычно неподалеку от гнезда, он может ненадолго сесть на кладку, когда самка уходит кормиться. Длительность насиживания — 33 — 38 дней. Кормятся на мелководьях, собирая корм с воды или доставая со дна, не ныряют. Питаются подводными частями растений, водорослями, беспозвоночными. Взрослеют и начинают размножаться к 4 — 5 годам.

Численность. В 1980-х гг. отмечено появление на гнездовании, а в дальнейшем

увеличение числа гнездящихся лебедя-шипунов в обл. В последнее десятилетие в обл. гнездится 2 — 3 пары и летует около 10 — 20 особей.

Лимитирующие факторы. Браконьерство — в большинстве случаев прекращение гнездования птиц в обл. связано с убийством взрослых и молодых птиц.

Принятые меры охраны. Включен в Красную книгу Белоруссии и региональные Красные книги Калужской, Курской и Рязанской обл. В Брянской обл. возможные места гнездования охраняются в ландшафтно-охотничьем заказнике «Будимирная пойма» и гидрологическом заказнике «Кожановское озеро».

Рекомендации по сохранению вида. Организация орнитологического заказника на Мирновском и Великоудебном вдхр. в Красногорском р-не с запретом охоты на водоплавающих птиц. Охрана гнездящихся птиц в других местах силами охотнадзора и общественности.

Источники информации: 1. Лозов и др. 1997; 2. Никифоров и др., 1997; 3. Кривоносов, 1987; 4. Материалы анкетирования, 2002; 5. Гавриш Г.Г., устн. сообщение; 6. Данные автора.

Автор: Ю.П. Федотов.

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН

Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758)

Отряд Гусеобразные — Anseriformes

Семейство Утиные — Anatidae

Статус. 3 категория.

Описание. Самый крупный из лебедей. От лебедя-шипуна отличается желтым основанием клюва и характерным вертикальным положением шеи во время плавания на воде. Клюв без шишки. Ноги черные. У молодых птиц клюв розовый с