## КРАСНАЯ КНИГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

**Лимитирующие факторы.** Обеднение кормовой базы. Применение пестицидов в сельском хозяйстве. Увеличение фактора беспокойства.

Принятые меры охраны. Включен в региональные Красные книги Калужской, Курской, Орловской и др. обл. Занесен в Приложение 2 СИТЕС. Специальные меры охраны в обл. не разработаны.

Рекомендации по сохранению вида. Изучение особенностей биологии и экологии вида в обл. и разработка мер по охране.

Источники информации: 1. Беме, Беме, 1952; 2. Лавров, 1982; 3. Лозов и др., 1997; 4. Рябицев, 2002; 5. Степанян, 1990; 6. Материалы анкетирования, 2002; 7. Данные авторов.

**Авторы:** В.А. Зудилин, Ю.П. Федотов.


## ОБЫКНОВЕННАЯ ПУСТЕЛЬГА

Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

Отряд Соколообразные — Falconidae

Семейство Соколиные — Falconidae


Статус. 3 категория.



Описание. Небольшой сокол (с голубя) с относительно широкими крыльями и длинным хвостом. У самца верх красновато-коричневый с круглыми пестринами, низ охристый с продольными пестринами, голова серая или сизая, «усы» почти незаметны, по концу хвоста темная полоса. Лапы короткие, не оперены, когти черные. У самки верх ржаво-рыжий с поперечными продольными полосами, голова почти одноцветна со спиной. Голос звонкое «ки-ки-ки» или «кли-кли-кли». В полете часто приостанавливается с поднятыми крыльями и опущенным хвостом, порхая на месте («трясется»). Старорусское название трясулька, украинское название боривітер — «борющийся с ветром». Вес самцов 115 — 205 г, самок — 135 - 260 г, длина 31 - 39 см, крыло самцов 22 - 26 см, самок -23 - 28 см, размах крыльев -69 - 82 см.

Распространение. Африка и почти вся Евразия от атлантического до тихоокеанского побережья в различных ландшафтных, зонах кроме Крайнего Севера [6].

Распространение в Брянской области. По-видимому, обитает на большей части обл. В первой половине XX столетия пустельга отмечена в Брасовском, Брянском, Карачевском, Новозыбковском и Трубчевском р-нах [2, 3, 8]. В 1950 — 70-х гг. —



обычный вид Трубчевского р-на [1]. В книге «Редкие и охраняемые животные и растения Брянской области»[4] характеризуется как вид, обитающий в южных, юго-западных и юго-восточных р-нах обл. За последнее десятилетие пустельга отмечена в 12 р-нах. В Брасовском р-не летом 2003 г. наблюдалась в окр. нп. Столбово, Городище-2, Крупец и Чаяновка [11, 13]. В Брянском р-не в 2002 г. встречена в окр. с. Глинищево [13]. В Дятьковском о-не в 2002 г. сообщается о гнездовании в окр. д. Бацкино и в долине р. Ивоток [11]. В Жирятинском р-не летом 2000 г. встречалась по полевым угодьям [11]. В Злынковском р-не в 2002 г. отмечена как гнездящийся вид [11]. В Клетнянском р-не в 2002 г. сообщается о гнездовании в окр. нп. Надва, Коростовец, Мощеное, Мужиново и Строительная Слобода [11]. В Новозыбковском р-не в 2002 г. встречалась в окр. нп. Ст. Вышков и Верещаки [11]. В Рогнединском р-не в 2001 — 2002 гг. отмечено гнездование пары птиц в урочище Засенье [11]. В Севском р-не в 2002 — 2003 гг. сообщается о гнездование в окр. нп. Б. Витичь и Курганка [11], а также в 2003 г. наблюдалась в окр. п. Первомайский [13]. В Суземском р-не в 1993 г. отмечена в окр. нп. Смелиж и Красная Слобода [5, 10]; в 1998 г. указана в числе птиц заказника «Колодезь» и охранной зоны заповедника «Брянский лес» [9]; в 2003 г. отмечена в окр. н.п. Суземка, Березовка и Денисовка [12, 13]. В Суражском р-не в 2002 г. указана как гнездящийся вид [11]. В Трубческом р-не в мае 2003 г. встречена в пойме Десны возле ур. Бонзонка [13].

Места обитания и образ жизни. Перелетная птица. Тяготеет к открытым местообитаниям в сочетании с удобными местами гнездования. В обл. это сельскохозяйственные земли, чередующиеся с перелесками, лесополосами и опушка-

ми лесных массивов. Гнездится чаще всего в старых гнездах ворон, грачей, сорок и других птиц на деревьях, на столбах  $\Lambda \Im \Pi$ , иногда поселяется в дуплах, на чердаках и на земле. В Трубчевском о-не отмечено гнездование в норах крутого коренного берега Десны [1]. Охотно занимают гнездовые ящики, сделанные специально для них [6]. Кладка в конце апреля — начале мая, состоит из 4-6(бывает 2-7) яиц. Насиживает самка, начиная с пеового яйца. Самец снабжает ее кормом. К людям относится терпимо, если часто не беспокоить. Длительность пребывания птенцов в гнезде - около месяца. Питается в основном мышевидными грызунами. При депрессии грызунов дополнительным и замещающим кормом служат насекомые (саранчовые. жуки, стрекозы и др.), ящерицы, лягушки и мелкие птицы. Зимует в Африке, на юге Азии, часть птиц в степной зоне.

Численность. В обл. ориентировочно численность не превышает 100-150 гнездящихся пар. Со второй половины XX столетия наблюдается резкое снижение численности вида. Если в 1930-70-х гг. в Брасовском и Трубчевском р-нах пустельга была обычной гнездящейся птицей, то сейчас встречается крайне редко [1, 5, 8, 13].

**Лимитирующие факторы.** Обеднение кормовой базы, использование в сельском хозяйстве пестицидов.

Принятые меры охраны. Включен в региональные Красные книги Курской, Орловской и Рязанской обл. В Брянской обл. специальные меры охраны не принимались.

Рекомендации по сохранению вида. Изучение особенностей биологии и экологии вида в обл. и разработка мер охраны. Вывешивание гнездовых ящиков в местах, подходящих для обитания вида.

## КРАСНАЯ КНИГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Источники информации: 1. Афанасьев, 19986; 2. Беме, Беме, 1952; 3. Воронцов, 1936; 4. Лавров и др., 1982; 5. Лозов и др., 1997; 6. Рябицев, 2002; 7. Степанян, 1990; 8. Суслова, 1937; 9. Федотов, Косенко, 1998; 10. Косенко, 1993 (летопись); 11. Материалы анкетирования, 2002; 12. Кузьменко Ю.В., устн. сообщение; 13. Данные авторов.

**Авторы:** Ю.П. Федотов, В.А. Зудилин.

## БЕЛАЯ КУРОПАТКА

Lagopus lagopus (Limnaeus, 1758)

Отряд Курообразные — Galliformes

Семейство Тетеревиные — Tetraonidae

Статус. 4 категория.

Описание. Птица средних размеров, крупнее серой куропатки. В зимнем наряде самцы и самки одинаково белые с черными рулевыми перьями, которые видны только в полете. У самцов весной шея и голова становятся ржавыми или красновато-коричневыми. Остальное оперение остается белым, иногда с отдельными коричневыми перьями на спине. У самок постоянного весеннего наряда нет. В летнем наряде у самцов и самок все оперение охристо-рыжее, с поперечными черными пестринами, только

маховые перья и часть кроющих крыла летом остаются чисто-белыми, и этим белые куропатки отличаются от всех остальных куриных, кроме тундряных куропаток. Голос самца — очень характерный громкий, резкий крик, напоминающий хохот и кваканье, напоминающий хохот, «керр...эр-эр-эрр...» и вслед за этим более тихое «кибэу... кибэу». Весенняя токовая песня начинается в полете во время снижения и заканчивается на земле.

Вес самцов 500 - 800, самок — 400 - 700 г, длина тела 37 - 42, длина крыла самцов — 18,9 - 23,0, самок — 17,8 - 22,0, размах крыльев 55 - 66 см.

Распространение. Северные и умеренные широты Евразии и Северной Америки, от арктических тундр до степей. В европейской части России южная граница сплошного распространения среднерусского подвида белой куропатки проходит по Смоленской, Тверской, северу Московской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Нижегородской обл. [2, 3].

Распространение в Брянской области. В настоящее время очень редкий залетный вид. За последнее десятилетие имеется только 3 сообщения о встречах



