



Распространение в Брянской области. По-видимому, обитает в большинстве р-нов. Отмечен в Брянском, Выгоничском, Жирятинском, Жуковском, Карачевском, Клетнянском, Мглинском, Навлинском, Новозыбковском, Почепском, Трубчевском, Суземском, Суражском, Унечском р-нах [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8]. Гнезда найдены в Суземском р-не в окр. д. Березовка и с. Красная Слобода [5], а также в Навлинском р-не по опушкам сосняков Ключовенского лесхоза.

Места обитания и образ жизни. Перелетные птицы. Появляются весной чуть позднее или в одно и то же время с полевыми жаворонками. Гнездовые местообитания — светлые негустые леса, лиственные и смешанные, главным образом сосновые, а также поляны, опушки, зарастающие вырубки и т.п. Гнезда устраивают на земле среди травы, под ее прикрытием. В кладке 3 — 6 яиц, чаще — 4 — 5. Насиживание начинают с завершением кладки. Сидит только самка, 12 — 15 дней. Птенцы оставляют гнездо на 13 — 15-й день жизни. Рацион взрослых птиц и птенцов, как и других жаворонков, содержит и животную, и растительную пищу. Отлетают в сентябре — октябре. Зимуют на юге Европы, в Сев. Африке, на Ближнем Востоке.

Численность. В Трубчевском, Суземском и частично в Брасовском и Навлинском р-нах в пределах Неруссо-Деснянского Полесья численность оценивается в пределах 100 — 200 гнездящихся пар, в Клетнянском и Мглинском р-нах в пределах Клетнянского комплексного охотничьего заказника — 100 — 150 пар [4]. Плотность населения птиц почти везде невелика, и в подходящих местообитаниях варьирует от 4 — 8 особей на 100 кв. км до 30 — 40 особей на 100 кв. км.

Лимитирующие факторы. Не выяснены.

Принятые меры охраны. Включен в региональные Красные книги Калужской, Курской и Орловской обл.

Рекомендации по сохранению вида. Изучение особенностей биологии и экологии, разработка мер по охране.

Источники информации: 1. Беме, Беме 1952; 2. Воронов, 1936; 3. Воронов, 1954; 4. Косенко, Кайгородова, 2000; 5. Косенко, Шпиленок, 1998; 6. Сулова, 1937; 7. Кузьменко Ю. Г., устн. сообщение; 8. Данные автора.

Автор: А.И. Артюхов.

СЕРЫЙ СОРОКОПУТ

Lanius excubitor Linnaeus, 1758

Отряд Воробьинообразные — Passeriformes

Семейство Сорокопутовые — Laniidae

Статус. 3 категория — редкий гнездящийся вид.

Описание. Самый крупный из наших сорокопутов (несколько крупнее скворца). Окраска сверху пепельно-серая, внизу белая. Крылья черные с белыми полосами. Хвост черный, длинный и ступенчатый. На голове имеется широкая темная полоса от клюва через глаз к уху. Ноги



сильные с острыми загнутыми когтями. Клюв сильный, на конце крючкообразно загнутый. Песня — тихая щебечущая трель; позывка — грубое «чек-чек». В природе очень похож на чернолобого сорокопута, от которого отличается большими размерами и серым лбом (черная полоса на голове начинается от клюва и не заходит на лоб). Молодые особи этих видов имеют одинаковые черные «маски», не заходящие на лоб; их можно различить по наличию волнообразных пестрин на животе и горле у серого сорокопута и их отсутствию у чернолобого сорокопута. Лучше всего производить идентификацию молодых в природе по присутствующим взрослым птицам. В зимний период у нас встречается только серый сорокопут. Вес 60 — 80 г, длина 23 — 28 см, крыло 10,9 — 12,6 см, размах крыльев 35 — 39 см.

Распространение. Северная Америка. Северная часть Африки. В Евразии обитает в различных ландшафтах — от тундры и лесов до степей, пустынь и гор. В европейской части России населяет север и среднюю полосу.

Распространение в Брянской области. Отмечен в 9 р-нах обл. Максимальное число встреч и первое подтверждение

гнездования вида в обл. [7] приходится на Суземский и Трубчевский р-ны в пределах Неруссо-Деснянского Полесья. Здесь в 1994 — 2003 гг. серый сорокопут отмечен в заповеднике «Брянский лес» (кв. 96 — 97, 117), Остролукском л-ве (кв. 23, 63) и в пойме Десны в окр. п. Солька Трубчевского р-на, а также в окр. нп. Березовка, Денисовка, Красная Слобода, Подгородняя Слобода и Теребушка Суземского р-на [7, 15, 18, 19]. В Клетнянском и Мглинском р-нах обитает в пределах Клетнянского комплексного заказника [6]. В Новозыбковском р-не в первой половине XX столетия указан как зимний залетный вид [1], а в 2003 г. в 5 км к юго-востоку от с. Ст. Вышков встречен выводок серого сорокопута [19]. В Климовском р-не в гнездовой период 1996 г. и 2000 г. вид наблюдался в долине р. Снов возле д. Кирилловка [5] и в окр. д. Рудня [14]. В Навлинском р-не летом 2003 г. единичные особи отмечены в сосновых перелесках возле ст. Чирково [15]. В Красногорском р-не летом 2003 г. взрослый сорокопут встречен в окр. с. Великоудебное [19]. В Карачевском р-не 11.09.03 г. между нп. Бошино — Юрасово найдена погибшая молодая особь во взрослом наряде [19]. На сопредельной территории Белоруссии



отмечен на гнездовании в Могилевском и Гомельском обл. [13]. В приграничных регионах Украины серый сорокопут сравнительно нередок на севере Черниговского Полесья, где он обитает в долинах рр. Снов, Ревна и Рванец Щорского, Корюковского и Семеновского р-нов [9, 19]. В Сумском Полесье вид встречается единично в пределах Деснянско-Старогутского национального природного парка (Середина-Будский р-н) [3]. В зимний период серый сорокопут не представляет редкости в Брянской обл.

Места обитания и образ жизни. В обл. гнездящийся, мигрирующий и зимующий вид. В зимний период наши серые сорокопуты сменяются птицами, мигрирующими из более северных регионов. Весной прилетает в конце марта — начале апреля. Населяет сосновые перелески, чередующиеся с открытыми местами, разреженные пойменные дубравы, редколесья и кустарники по лугам в долинах малых рек, зарастающие вырубki и гари с отдельными деревьями, сосново-сфагновые болота с угнетенным древостоем. Биотопические предпочтения серого сорокопута в Брянской обл. отличаются от северных регионов, где вид в основном гнездится по верховым болотам [10], и сходны с таковыми для Мещеры [2] и Черниговского Полесья Украины [19], где вид тяготеет к пойменным местообитаниям. Гнезда устраивает на деревьях и кустах на высоте от 2 до 15 м. В кладке 4 — 7, изредка до 9 яиц. Насиживание начинается с откладки последнего яйца и длится 14 — 18 дней, насиживает самка, и только иногда ее сменяет самец. Птенцы находятся в гнезде 18 — 20 дней [12]. Родители выкармливают молодых длительное время. Питание в летний период состоит в основном из крупных насекомых (жуки, клопы, стрекозы и др.) и мелких позвоночных

(ящерицы, воробьиные и мелкие млекопитающие). Зимой в питании преобладают мелкие птиц и грызуны. Часто делает запасы, накалывая добычу на колючки или острые сломы веток.

Численность. В Трубчевском и Суземском р-нах в пределах Неруссо-Деснянского Полесья численность вида в 2000 гг. составила 5 — 15 гнездящихся пар [4]. В Клетнянском и Мглинском р-нах в пределах Клетнянского комплексного заказника — не менее 3 пар [6]. В Климовском р-не в долине р. Снов и ее притоков вблизи границы с Украиной предположительно гнездится не менее нескольких десятков пар [19]. Общая численность вида в обл. предположительно составляет не менее 100 гнездящихся пар.

Лимитирующие факторы. В пределах освоенных человеком ландшафтов — химизация сельского хозяйства и уменьшение площадей гнездовых биотопов [8].

Принятые меры охраны. Включен в Красную книгу России, а также в Красные книги Республики Беларусь и Украины. Внесен в Бернскую конвенцию (1979). Специальные меры охраны в обл. не разработаны. Охраняется в заповеднике «Брянский лес», в ландшафтном заказнике «Колодезь» и Клетнянском комплексном охотничьем заказнике.

Рекомендации по сохранению вида. Изучение распространения вида в обл., выяснение особенностей биологии и экологии, разработка мер по охране.

Источники информации: 1. Беме, Беме, 1952; 2. Иванцев, Катюков, 1998; 3. Клестов и др., 1998; 4. Косенко, 2001; 5. Косенко, Калякин, 1998; 6. Косенко, Кайгородова, 2000; 7. Косенко, Лозов, 1998; 8. Красная книга РФ, 2001; 9. Кузьменко, 1998; 10. Мальчевский, Пукинский, 1983; 11. Никифоров и др.,

1997; 12. Рябицев, 2002; 13. Федюшин, Долбик, 1967; 14. Материалы анкетирования, 2002; 15. Воеводин П. В., устн. сообщение; 16. Косенко С. М., устн. сообщение; 17. Кузьменко Ю. В., устн. сообщение; 18. Ситникова Е. Ф., устн. сообщение; 19. Данные авторов.

Авторы: Г.Г. Гавришь,
Ю.П. Федотов.

ВЕРТЛЯВАЯ КАМЫШЕВКА

Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)

Отряд Воробьинообразные —
Passeriformes

Семейство Славковые — Sylviidae

Статус. 4 категория.



Описание. Птица мелких размеров (чуть меньше воробья), обитающая в водно-болотных угодьях. Клюв тонкий заостренный. Общая окраска оперения пестрая. Верх головы темно-бурый с продольной светло-охристой полосой по центру и светлыми «бровями». Верх рыжевато-коричневый с темными продольными пестринами на спине и крыльях. Надхвостье рыжеватое; низ беловато-охристый с мелкими темными штрихами на горле и боках туловища. Клюв коричневый, ноги желтовато-коричневые. Внешне очень похожа на камышевку-барсучка, от которой отличается светлой полосой на

голове, светлыми полосами на плечах и наличием темных штрихов на боках тела. Песня также очень напоминает тревожную позывку камышевки-барсучка, но более продолжительная. Состоит из отдельных трелей, перед каждой из которых обязательно идет горловой звук «трррр», например — «трррр-ди-ди-ди-ди, тррр-ти-ти-ти-ти, тррр-лю-лю-лю-лю» и т.п. Поет в траве либо на возвышающихся кустах и стеблях. Временами совершает токовый полет по дуге через открытое место. Вес 10 — 18 г, длина тела около 13 см, размах крыльев 16 — 20 см.

Распространение. Современный гнездовой ареал вида охватывает Центральную и Восточную Европу, в частности, восточную часть ФРГ, Польшу, Венгрию, Литву, Белоруссию, Украину и Россию [6, 7]. В России в начале XX столетия обл. обитания вертлявой камышевки простирались на значительной территории от Среднерусской возвышенности до верховий Енисея. На север до Ярославской, Тверской, Нижегородской, Пермской обл., на восток до Екатеринбургской обл., на юге до Курской и Воронежской обл., Мордовии, окрестностей Пензы и Уфы. После середины XX столетия вид найден гнездящимся только в Калининградской обл., на севере Пензенской обл., в Татарстане и на юге Зап. Сибири. Одиночные птицы были отмечены в Московской, Тверской и Пермской обл. [4].

Распространение в Брянской области. Достоверных сведений о гнездовании вертлявой камышевки непосредственно на территории Брянщины нет, если не считать находки в 1997 г. небольшой колонии (3 — 5 поющих самцов) с украинской стороны заболоченной поймы р. Снов между с. Елино Щорского р-на Черниговской обл. и с. Хоромное Климовского р-на Брянской обл. [6, 9]. В настоящее время этот регион (пойма