БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ЦАПЛЯ *EGRETTA ALBA* В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.Ю. Кайгородова, С.М. Косенко
Государственный природный биосферный заповедник «Брянский лес»

Большая белая цапля (*Egretta alba*) гнездится в Брянской области как редкий гнездящийся вид. В ряде соседних регионов – Смоленской, Курской областях и в Белоруссии – она также внесена в Красные книги. В Орловской области большая белая цапля (далее – также белая цапля) включена в «Перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде».

Материал для настоящего сообщения в основном был собран в 2005-2013 гг. во время экспедиционных поездок по области. При этом посещались места обитания, пригодные для белой цапли, проводился опрос местных жителей. Дополнительные сведения поступили от инспекторов охраны заповедника и бывших специалистов Управления Федеральной службы Россельхознадзора. Значительная часть полученных сведений была опубликована ранее в наших ежегодных отчетах о встречах редких и охраняемых видов птиц Брянской области (Кайгородова и др., 2006; Кайгородова, 2007, 2008, 2010; Кайгородова, Косенко, 2005, 2011, 2012) и Неруссо-Деснинском полесье (Косенко, Кайгородова, 2007, 2008, 2010-2012 и др.); здесь они приводятся без ссылок на источник информации. В настоящем сообщении делается попытка обобщить накопленный материал по распространению белой цапли на территории Брянской области, уточнить статус ее пребывания, а также необходимость специальных мер охраны.

Встречи большой белой цапли в административных районах Брянской области

В этом разделе приводятся обобщенные описания встреч белой цапли, сгруппированные по административным районам Брянской области (рис. 1).

Брасовский район. Взрослая особь в сопровождении двух еще плохо летавших молодых птиц (размером заметно меньше взрослой) *встречены в июне 2007 г. в* низовье малой реки Зевра – правого притока р. Нерусса – в окрестностях п.г.т. Локоть (Н.А. Ромашин, личн. сообщ.). Скопление из 30 особей наблюдали в конце сентября 2007 г. на пруду с. Клинское. Одиночных особей регулярно встречали в 2010 г. и 2011 г. по берегам рыборазводных прудов, созданных на месте выгоров торфа, в луговой пойме р. Нерусса в окрестностях д. Крупец. Кроме того, одиночные особи отмечались на пруду д. Красный Колодец в 1998 г. (А.Е. Гуляев, анкета) и в пойме р. Летча в окрестностях д. Городище (2-е) в августе 2013 г. (Н.А. Ромашин, личн. сообщ.).

Брянский район. Две особи встречены 19.08.2011 в устье р. Болва (Шумик, 2011).

Выгоничский район. Одиночные особи отмечались в 2000 г. в пойме р. Десна в окрестностях пос. Малиновка (П.В. Борисов, личн. сообщ.). Также к 2000-м годам относятся встречи одиночных особей в пойме Десны у п.г.т. Выгоничи (2003 г.; Ю.А. Трушкин, личн. сообщ.) и с. Уручье (июль 2005 г.). Отмечена также в устье р. Ловча, на пруду пос. Ленинский и в окрестностях с. Карповка (Артюхов, Федотов, 2004).

Гордеевский район. Скопление до 20 особей, а также одиночные особи наблюдались летом 2008 г. в пойме р. Ипуть (соответственно, в окрестностях с. Казаричи и с. Смяльч). Кроме того, 6 особей встречены 10.08.2010 в окрестностях д. Андреевка-Печевая (Шумик, 2010). Для сравнения: в июне 1996 г. на участке р. Ипуть от с. Казаричи до с. Смяльч не встречена ни разу.

Жирятинский район. До 7 особей держались 24.08.2013 у пруда в д. Литовники (А.В. Скачков, личн. сообщ.).

Жуковский район. Четыре особи отмечены в 2002 г. в окрестностях д. Песочня (В.А. Савостьянов, анкета).

Злынковский район. Скопления до 28 особей наблюдали в сентябре 2012 г. на лесном озере среди сфагнового болота в ур. Малинов Остров (пойма р. Ипуть в окрестностях п.г.т. Вышков); там же в апреле 2013 г. отмечены 5-6 особей (П.Н. Сушенок, личн. сообщ.). В 2000-2002 гг. белую цаплю отмечали с апреля по сентябрь на мелиоративных каналах поймы р. Ипуть в окрестностях с. Добродеевка (П.Н. Сушенок, личн. сообщ.); там же одиночная особь встречена в июне 2012 г. Шумиком (2012). От 1 до 7 особей кормились в 2004-2013 гг. на зарыбленных прудах между д. Карпиловка и пос. Новолюбин (П.С. Сахнов, личн. сообщ.). Другое излюбленное место кормежки белой цапли – верховья пруда в окрестностях с. М. Щербиничи, где 19.07.2011 наблюдали до 4 особей одновременно.

Клетнянский район. В августе 1979 г. группа из 5 особей была встречена между с. Акулиничи-1 и с. Печня. Автор этого наблюдения Е.Д. Голочерепов вначале принял эту группу за выводок; в такой интерпретации это сообщение и было опубликовано (Артюхов, Федотов, 2004). Позднее Е.Д. Голочерепов (личн. сообщ.) признал отсутствие оснований считать встреченных особей семейной группой. Одиночные особи или группы до 5 особей



Рис. 1. Распространение большой белой цапли в Брянской области: 1 – гнездование; 2 – предположительное гнездование в местах регулярных встреч или скоплений; 3 – регулярные встречи и/или массовые скопления; 4 – единичные встречи. Места, отстоящие друг от друга менее чем на 5 км, при нанесении на карту объединялись.

отмечались Е.Д. Голочереповым также на зарыбленных прудах в окрестностях д. Романовка, д. Сметковщина и с. Лутна.

Климовский район. Скопление из 15 особей наблюдали в 2002 г. в пойме р. Снов на бывших торфоразработках в окрестностях с. Курозново. Несколько особей встречены весной 2010-2012 гг. во время половодья на р. Снов в окрестностях д. Крушинник (В.В. Зарудко, личн. сообщ.). Одиночных особей ежегодно отмечали в начале 2000-х гг. на Борьбинских озерах в 2 км к северу от с. Фоевичи.

Клинцовский район. Артюхов и Федотов (2004) предполагали существование гнездовых колоний в 2000-2002 гг. в кварталах 7-9 Клинцовского лесничества. На рыборазводном пруду в пойме р. Ельня у д. Кокушье в июле 2007 г. наблюдали не менее 7 особей; Артюхов и Федотов (2004) предполагали гнездование там до 20 пар в 1989-1990 гг. Одиночные особи или группы по 2-8 особей регулярно встречались с начала 2000-х гг. в широкой пойме р. Ипуть, покрытой густой сетью стариц, рукавов и затонов, от пос. Новоандреевка до ур. Борозёнщина в окрестностях с. Ущерпье; в скоплениях насчитывали до 120 особей. Для сравнения: в июне 1996 г. на участке р. Ипуть от ур. Новый Рассвет до с. Ущерпье не встречена ни разу, тогда как 2.08.2001 у с. Ущерпье насчитывалось до 8 особей. С середины 2000-х гг. белая цапля ежегодно отмечалась также на бывших торфоразработках ур. Ректа в окрестностях с. Гута-Корецкая (Н.П. Мироненко, личн. сообщ.). В июле 2007 г. там насчитывали до 25 особей. Кроме того, 4 особи встречены 12.09.2012 в пойме р. Титва у пос. Первомайский (Шумик, 2012), где имеются рыборазводные пруды.

Комаричский район. Скопление до 20-25 особей наблюдали в сентябре 2002 г. на пруду пос. Ивановский (Н.И. Богунков, инета); Артюхов и Федотов (2004) предполагали гнездование 3-4 пар в этом месте в 2000-2003 гг. Недалеко отсюда, на пруду с. Аркино, 2-3 особи встречены летом 2007 г.; тогда же наблюдали 5-6 особей на пруду с. Литиж (В.А. Егоров, личн. сообщ.).

Красногорский район. Три молодые особи отмечены в мае 2006 г. в смешанной гнездовой колонии белой и серой цапель в сосняке у западного берега Мирновского водохранилища в окрестностях с. Яловка; ранее в 2001 г. в этом месте гнездилась только серая цапля. По мнению И.А. Хандожко белая цапля начала гнездится на водохранилище предположительно с 1997 г. Иногда здесь образуются крупные скопления; так, в июле 2000 г. насчитывалось до 40-50 особей (А.М. Дробков, личн. сообщ.), летом 2007 г. – около 100 особей (И.А. Хандожко, личн. сообщ.). Гораздо более обычны одиночные особи или группы по 2-4 особи, встречаемые ежегодно в весенне-летний период.

Мглинский район. Артюхов и Федотов (2004) предполагали существование гнездовых колоний в устье р. Воронуса. Здесь в конце августа 2001 г. наблюдали 20 особей, в 2002 г. – 2 особи (В.Е. Прохоренко, личн. сообщ.), в июле 2003 г. – 10 особей (Ю.В. Кузьменко, личн. сообщ.), в июле 2006 г. – до 8 особей, в середине апреля 2011 г. – 4 особи. Скопление из 15 особей наблюдали 28.08.2013 на выбитом скотом пастбище к востоку от г. Мглин (В.И. Бабанина, Е.Ю. Пилютина). Одиночных особей неоднократно отмечали в пойме р. Ипуть: в окрестностях д. Луговка – летом 2007 г., весной и летом 2010 г.; в окрестностях пос. Водославка – летом 2010 и 2011 гг. Кроме того, одиночные особи встречались на небольшом пруду у д. Цинка в июле 2011 и 2013 гг.

Навлинский район. Известна всего одна встреча: 1 особь кормилась 6.08.2008 на пруду пос. Кукуевка.

Новозыбковский район. Одиночные особи встречены 18.07.2007 на лесном озере Мартыновка в кв. 76 Новозыбковского лесничества и 14.07.2008 – в луговой пойме р. Ипуть в окрестностях с. Перевоз.

Погарский район. Группу из 6 особей наблюдали в середине мая 2005 г. на пруду в окрестностях хут. Глинки (Федотов, 2005). Две особи летали 17.07.2007 над поймой р. Вабля в окрестностях с. Посудичи. В других местах отмечались только одиночные особи: в окрестностях д. Чаусы (Артюхов, Федотов, 2004), 5.05.2008 – в окрестностях с. Заречное, 18.07.2011 – в окрестностях пос. Чайкино.

Почепский район. Группу из 5 особей наблюдали 11.07.2007 над поймой р. Судость

в окрестностях с. Рогово. Одиночные особи отмечались в августе 1999 г. (В.Ф. Тютюнков, личн. сообщ.) и 12.07.2013 на пруду в окрестностях пос. Гряда.

Рогнединский район. Артюхов и Федотов (2004) предполагали гнездование белой цапли в пределах района по долине Десны. Нам известны лишь несколько встреч. Так, одиночные особи встречены в 2000 г. в ур. Копань (В.М. Добычин, анкета), 1.08.2013 – над поймой р. Снопоть в окрестностях с. Снопоть. Кроме того, две особи кормились 2.08.2013 на большом рыборазводном пруду в ур. Совхоз (около 2 км к юго-западу от бывшей д. Каменка).

Севский район. Большая часть встреч относится к рыборазводному пруду в пойме р. Уль у пос. Добрунь. По мнению Артюхова и Федотова (2004), а также других наблюдателей (В.В. Епишин, А.В. Кожухов, А.И. Шаламов), белая цапля гнездилась здесь в начале 2000-х гг. В 2007 г. там насчитывалось до 12 особей, в 2012 г. – до 18 особей. Известно также скопление из 5-6 особей в 2001-2002 гг. на искусственном водоёме к северо-востоку от с. Лемешовка.

Стародубский район. Гнездование предполагалось П.И. Глушаковым (личн. сообщ.) в ур. Брезгуновское болото, расположенном между д. Соколовка и пос. Красный. Там с 1997 г. ежегодно отмечались скопления; в августе 2002 – до 7 особей (П.И. Глушаков, личн. сообщ.), летом 2007 г. – 30 особей. Кроме того, белая цапля встречалась в окрестностях д. Суховерхово (Артюхов, Федотов, 2004). Лушков и др. (2008) наблюдали её летом 2008 г. у с. Дареевичи, а также на р. Бахаевка.

Суземский район. Скопление из 28 особей наблюдали 15.06.2007 на месте бывших торфоразработок в окрестностях пос. Новенькое. Однако большая часть встреч приурочена к пойме р. Нерусса: одиночные особи или группы по 2-6 особей отмечались там регулярно в 2005-2013 гг., особенно на мелководье затона р. Нерусса у заповедного кордона Старое Ямное, в окрестностях д. Чухраи, с. Ямное, д. Денисовка, д. Смелиж; отмечена также в памятниках природы «Колодезь» и «Неруссо-Севный». В 2000-х и 2010-х гг. встречалась даже на небольших прудах в д. Теребушка, с. Негино, с. Горожанка и др.

Суражский район. Около 10 особей держались в 2001-2003 гг. в ур. Крахмальный у правого берега р. Ипуть в окрестностях пос. Ковалёвщина (В.Г. Выгонный, личн. сообщ.); по мнению местных жителей здесь белая цапля гнездилась вместе с серой цаплей. Не менее 200 особей кормились в 1995 г. вдоль дренажных каналов в пойме р. Ипуть к востоку от с. Нивное; 13-14.04.2012 там в половодье наблюдали до 35 особей одновременно. Наибольшая часть встреч приурочена к широкой заболоченной пойме р. Ипуть на участке между д. Крутояр и д. Красное, имеющей статус ключевой орнитологической территории международного значения. Здесь белая цапля регулярно отмечается с 2001 г. Кроме того, она – не редкость на р. Ипуть в окрестностях г. Сураж.

Трубчевский район. Первая в районе встреча с белой цаплей состоялась в апреле 1984 г. в окрестностях г. Трубчевск (Лозов, Шпиленок, 1990). С тех пор она отмечается в районе ежегодно. Гнездование установлено в июле 1994 г. (Лозов и др., 1997); тогда около 10 пар белой цапли образовали гнездовую колонию совместно с серой цаплей на кустах ивы в низовье р. Нерусса (Лозов, 1998). В июне 1996 г. в двух осмотренных гнездах находились по 4 оперённых птенца (Лозов, 2008). По нашим наблюдениям в июле 2004 г. в колонии все еще держались белые цапли. Однако в 2009 г. колония не была найдена на старом месте; предположительно, в 2007 г. она переместилась к северо-востоку (Кругликов, 2011). Как бы то ни было, белая цапля попрежнему обычна в низовьях р. Нерусса (в апреле 2011 насчитывали до 15 особей, в мае – до 12 особей одновременно). Артюхов и Федотов (2004) и Лозов (2008) предполагали гнездование белой цапли ещё на двух участках в междуречье Десны и Быстрика: напротив д. Алёшенка и д. Будимир. Там 14.07.2000 наблюдали скопление численностью не менее 25 особей (Лозов, 2008). В ночевочном скоплении белой цапли 27.8.2001 у д. Будимир насчитывалось 124 особи. В целом белая цапля встречается чаще всего в пойме р. Десна, особенно у пос. Бородёнка, д. Будимир, с. Селец. Кроме того, встречи с ней обычны и в нижнем течении р. Нерусса: на плёсах и по

берегам реки в границах заповедника, в ур. Рум и Кудеяры. Иногда она залетает на оз. Большое Жерено.

Унечский район. Встречалась на пруду в д. Новые Ивайтёнки: 5 особей – в сентябре 2012 г. (Шумик, 2012), 3 особи – 6.10.2013 (Е. Дубовцев, личн. сообщ.).

Распространение

Большая белая цапля считается видом-космополитом. В настоящее время она широко распространена в тропическом и умеренном поясах, встречается на всех континентах кроме Антарктиды (Martínez-Vilalta, Motis, 1992). За последние 150 лет ареал вида претерпел значительные изменения. В середине 19-го века северная граница ареала большой белой цапли еще не достигала пределов Брянщины и проходила по территории нынешней Украины через Львовскую и Харьковскую области. Во второй половине 19-го века началась добыча многих видов белых цапель; в результате на значительной части своего ареала большая белая цапля была полностью истреблена. После запрета добычи белых цапель в СССР, введенного в 1920-е гг., ее численность и ареал начали постепенно восстанавливаться (Грищенко, 2011).

На соседних с Брянщиной территориях расселение белой цапли началось с конца 1970-х гг. В Сумской области Украины первые кочующие особи отмечены в апреле 1978 г. в окрестностях с. Ивот, гнездование трех пар установлено в мае 1985 г. в окрестностях с. Лески (Афанасьев, 1995). В Черниговской области 3-8 пар белой цапли были отмечены в колонии серых цапель в 1986 г. в окрестностях с. Леньково (Афанасьев, 1995). В Белоруссии встречи с белой цаплей участились с 1980-х гг., а к началу 1990-х гг. установлены случаи гнездования, в том числе в Гомельской области (Никифоров, Самусенко, 2006), граничащей с Брянской областью. Ближайшая к нам колония из 8 гнезд была найдена в Хойникском районе Гомельской области в 1994 г. (Никифоров, 2001). В Смоленской области залеты первых особей отмечены в 1995 г.; к середине 2000-х гг. белая цапля стала там гнездящимся видом (Те и др., 2006). В Калужской области этот вид начал встречаться во время сезонных миграций и летних кочевок с 1984 г. (Марголин, 2000). В Орловской области это редкий и летующий вид; впервые она встречена в 2001 г., а с 2007 г. встречи стали регулярными (Недосекин, 2013). В Курской области залеты белой цапли в поймы рек Псёл и Сейм (юго-западные районы области) начали регистрировать в последние десятилетия 20-го века, с 1973 г. (Власов, Миронов, 2008); к середине 1990-х гг. она вновь загнездилась после длительного перерыва (Миронов, 1996, 1998).

В научной литературе до последнего времени не было никаких сведений о пребывании белой цапли на территории Брянской области до 1980-х годов (Бёме, Бёме, 1952; Суслова, 1935; Федосов, Никитин, 1951; Лавров, 1983). Самой первой можно считать ее встречу Е.Д. Голочереповым летом 1979 г. в окрестностях с. Акулиничи-1 и с. Печня Клетнянского района (см. выше). В 1980-х годах белая цапля все еще оставалась редким залетным видом; все известные встречи относятся к Трубчевскому району. В 1990-х годах ее численность возросла, и на летовании она стала регулярно встречаться в Трубчевском, Стародубском и Красногорском районах. Начиная с 2000-х гг. белая цапля стала регулярно встречаться с апреля по август-сентябрь в большинстве районов.

Впервые на гнездовании белая цапля отмечена в 1994 г. в низовьях р. Нерусса в Трубчевском районе (см. выше). Гнездовая колония существовала до середины 2000-х гг., а затем исчезла или переместилась в другое место. Другая известная нам колония находилась на берегу Мирновского водохранилища в Красногорском районе; она существовала предположительно с 1997 по 2006 гг. В обоих случаях белая цапля гнездилась вместе с серой цаплей. Кроме того, по крайней мере одна пара успешно размножалась в пойме р. Нерусса в окрестностях п.г.т. Локоть Брасовского района.

Предположения Артюхова и Федотова (2004) о гнездовании белой цапли в других местах, вероятно, основаны на регулярных встречах и массовых скоплениях птиц в гнездовой период. При посещении предполагаемых мест гнездования обнаружить

колонии не удалось; в результате опроса бывших сотрудников охотнадзора и местных жителей гнездование также не подтвердилось. Однако, поскольку белая цапля нередко образует временные гнездовые поселения в труднодоступных местах, вполне возможно, что ко времени проверки гнездовые колонии прекратили существование. Таким образом, количество мест, где белая цапля выводила птенцов хотя бы один раз, скорее всего, гораздо больше, чем нам удалось установить наверняка. Предположительно это два участка в Клинцовском районе, два – в Трубчевском районе и по одному – в Комаричском, Мглинском, Севском, Суражском и Стародубском районах (рис. 1).

Можно предположить, что в Брянской области встречаются преимущественно неполовозрелые летующие особи. В местах с обилием корма нередко образуются зрелищные скопления, обычно до 20-50 особей. Это явление имеет несомненное эстетическое значение. Такие заслуживающие особого внимания скопления белой цапли отмечены в окрестностях п.г.т. Вышков в Злынковском районе, в окрестностях д. Крушинник в Климовском районе, на Брезгуновском болоте в Стародубском районе, в окрестностях пос. Новенькое в Суземском районе, пос. Ивановский в Комаричском районе, с. Клинское в Брасовском районе, в низовьях р. Нерусса в Трубчевском районе. Реже образуются скопления до 100 или более особей. Такие крупные скопления посчастливилось наблюдать на Мирновском водохранилище в Красногорском районе, в поймах рек Ипуть (окрестности с. Ущерпье в Клинцовском районе и с. Нивное на границе Мглинского и Суражского районов) и Десна (например, окрестности д. Будимир в Трубчевском районе).

Сроки прилёта и отлёта

Большая белая цапля принадлежит к рано прилетающим видам. Первые особи могут появиться, когда водоемы еще покрыты льдом (Грищенко, 2011; наши данные). В Суземском и Трубчевском районах области первые весенние мигранты появляются во второй половине марта – начале апреля. Средняя дата прилёта – 1 апреля, самая ранняя – 16 марта, самая поздняя – 20 апреля (табл. 1). Первая регистрация белой цапли во второй половине апреля 2003 г. может быть результатом позднего наступления весны в том году.

Начало миграции к местам зимовки приходится на конец августа, и продолжается до конца сентября. Средняя дата последней встречи – 21 сентября, самая ранняя – 28 августа, самая поздняя – 30 октября (табл. 2). Столь поздняя задержка могла быть связана с ослабленным состоянием птицы и ее неспособностью к полету.

Местообитания

Большая белая цапля – один из наиболее пластичных видов цапель при выборе гнездовых стаций (Грищенко, 2011). Но из-за белого демаскирующего оперения она более пуглива, чем серая цапля, и вынуждена устраиваться на гнездовании в наиболее

Таблица 1

Первые весенние встречи большой белой цапли

Дата	Место наблюдения	Источник информации
9.04.1994	низовье р. Нерусса, ур. Холм	Лозов и др. (1997)
20.04.2003	заказник «Будимирская Пойма»	В.А. Воробьев
25.03.2004	заказник «Будимирская Пойма»	Кругликов, Горенков (2005)
16.04.2005	заказник «Будимирская Пойма»	М.В. Бабанин
7.04.2007	ур. Бонзонка	М.В. Бабанин
16.03.2008	ур. Лучанский	Кругликов (2011)
1.04.2009	ур. Бобровый затон	И.А. Моисеенков
19.03.2010	Румовской мост	В.А. Бережнов
23.03.2011	д. Чухраи	О.Н. Батова

Таблица 2

Последние летне-осенние встречи большой белой цапли

Дата	Место наблюдения	Район	Источник информации
8.09.1984	пойма р. Нерусса	Трубчевский	Лозов, Шпиленок (1990)
30.10.2001	пойма р. Десна	Трубчевский	А.Н. Боровков
30.08.2003	д. Чаусы	Погарский	Ю.П. Федотов
18.10.2007	с. Великоудебное	Красногорский	Е.Ю. Кайгородова
28.09.2009	ур. Лучанский	Трубчевский	Кругликов (2011)
19.08.2011	устье р. Болва	Брянский	Шумик (2011)
17.09.2012	окрестности п.г.т. Вышков	Злынковский	П.Н. Сушенок
28.08.2013	окрестности г. Мглин	Мглинский	В.И. Бабанина, Е.Ю. Пилютина

труднодоступных участках, в глубине обширных зарослей тростника, камыша и рогоза. Белая цапля обычно строит гнезда на заломах прошлогодних стеблей, реже устраивает колонии на сплошных кустарниковых зарослях или на вершинах деревьев. Поэтому привлекательны для неё заболоченные местообитания на месте бывших торфоразработок. В Брянской области это такие территории как ур. Ректа площадью около 600 га в Клинцовском районе, Брезгуновское болото площадью около 150 га в Стародубском районе, пойма р. Сеов в окрестностях д. Крушинник и с. Бурозново в Климовском районе.

Благоприятными для расселения этого вида оказались многие антропогенные изменения среды, такие как создание водохранилищ и запруд на реках, рыборазводных прудов (Грищенко, 2011). Цапля охотно кормится по берегам прудов, особенно рыборазводных. На таких прудах ежегодно держатся 1-2 или группы до 10 особей. Возможно, белая цапля размножается в окрестностях водоёмов. В Брянской области пруды, где цапля отмечалась в гнездовой период, имеются в окрестностях д. Кожушье Клинцовского района, около пос. Добрунь Севского района, в окрестностях д. Карповка и пос. Новолюбин Злынковского района, в окрестностях д. Романовка, с. Лутна и д. Сметковщина Клетнянского района, в окрестностях хут. Глинки Погарского района.

Основные угрозы и лимитирующие факторы

Распределение белых цапель на водоёме зависит от обилия рыбы (Грищенко, 2011). В случае её недостатка в рационе появляются водные насекомые и их личинки, земноводные, пресмыкающиеся, грызуны, мелкие птицы, ракообразные, моллюски и др. Основным лимитирующим фактором выступает недостаточная ёмкость кормовых угодий, особенно в период выкармливания птенцов. Так, на западе Брянской области на месте крупнейшего торфяного месторождения в долине р. Вихолка в начале 1990-х гг. было создано Мирновское водохранилище. Богатые рыбные запасы нового водоёма привлекли на гнездование белую и серую цапли, большого баклана и чайковых птиц (Кузьменко, Федотов, 2005). Со временем рыбные запасы снизились, что привело к исчезновению гнездовых колоний цапель и бакланов, сокращению численности чаек и крачек.

Другой не менее важный фактор – угроза сокращения или исчезновения пригодных мест обитания из-за изменения гидрологического режима. Во второй половине 20-го века в Брянской области была проведена масштабная осушительная мелиорация в поймах рек для расширения сельскохозяйственных угодий и для добычи торфа на болотах (Кудленок, 1983). В конце века мелиоративные системы пришли в запустение, и начался обратный процесс заболачивания в поймах рек и обводнения болот.

Еще один важный фактор – это беспокойство на местах потенциального гнездования. Белая цапля не заселяет оптимальные для нее угодья, если они регулярно посещаются рыбаками или охотниками. Кроме того, выжигание сухой прибрежной растительности лишает белую цаплю возможных мест гнездования.

Добыча белой цапли в коммерческих целях для украшения головных уборов ушла в прошлое. Однако, как рыбоядная птица, она подвергается преследованию со стороны человека на рыборазводных прудах, особенно в местах массовых скоплений или вблизи мест гнездования.

Проблемы сохранения вида

Пригодные места обитания белой цапли охраняются в природных заказниках «Деснянско-Жеренский» и «Будимирская пойма» (Трубчевский район), памятнике природы «Кожановское озеро» (Красногорский и Гордеевский районы). Там белая цапля ежегодно отмечается в течение всего теплого времени года, нередко образуя скопления до нескольких десятков особей; на других ООПТ она отмечается реже.

Имеется ряд других природных территорий, на которых широко представлены водно-болотные угодья – места обитания белой цапли, и где она встречается. На них уже подготовлены необходимые проектные документы для организации ООПТ; это «Малиноостров» в Злынковском районе, «Ипутьский» в Новозыбковском районе, «Болонье» в Клинцовском районе, «Великий Берег» в Гордеевском районе, «Нивное» в Суражском районе. По результатам паспортизации ООПТ Брянской области на эти территории в 2008 г. были подготовлены необходимые проектные документы для придания им статуса ООПТ. К сожалению, организация памятника природы «Мирновское водохранилище» в Гордеевском и Красногорском районах не получила поддержки местных властей (проектные документы не прошли согласование на районном на уровне). На другие проектируемые ООПТ («Малиноостров» в Злынковском районе, «Ипутьский» в Новозыбковском районе, «Болонье» в Клинцовском районе, «Великий Берег» в Гордеевском районе, «Нивное» в Суражском районе) в установленные сроки не была проведена экспертиза; в результате эти природные территории также не получили статуса ООПТ.

К настоящему времени встречи белой цапли в Брянской области стали настолько частыми, что вполне оправданным представляется вопрос о необходимости занесения ее в Красную книгу области. С одной стороны, численность белой цапли в области выросла настолько, что этот вид вряд ли нуждается в специальных мерах охраны. К тому же ее численность растет повсеместно, исконный ареал не только восстановился, но и расширяется, чему благоприятствуют такие виды человеческой деятельности, как создание рыборазводных прудов (Грищенко, 2011). С другой стороны, белая цапля в Брянской области все еще продолжает оставаться периферийным видом (обитающим на краю ареала). Кроме того, эстетическая ценность объекта – один из критериев (пусть и подчиненный) отбора объектов животного и растительного мира для занесения в Красную книгу субъекта РФ (Методические …, 2006). С учетом всех этих доводов мы предлагаем исключить большую белую цаплю из списка охраняемых видов птиц Брянской области и включить её в перечень таксонов и популяций животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде.

Выводы

Большая белая цапля впервые отмечена на территории Брянской области в 1979 г. в Клетнянском районе. Гнездовая колония впервые найдена в 1994 г. в низовьях р. Нерусса в Трубчевском районе. На гнездовании в области отмечена также в Брасовском и Красногорском районах. Еще в 9 местах гнездование предполагалось ранее.

На летовании белая цапля обычна, образуя временные скопления от нескольких десятков до сотен особей в местах повышенной кормности угодий.

Весной первые белые цапли появляются со второй половины марта. Осенью последние встречи приходятся на вторую половину сентября.

Основной лимитирующий фактор для белой цапли – низкий уровень рыбных запасов в водоемах, из-за чего не все они привлекательны для этого вида.

Ряд мест обитания обеспечены территориальными формами охраны в заказниках и памятниках природы «Деснянско-Жеренский», «Будимирская пойма» и «Клюшановское озеро». Места гнездования не охвачены территориальной формой охраны.

Большая белая цапля – расселяющийся вид; ее ареал продолжает расширяться, а численность – увеличиваться. Рекомендуется ее перевод из списка охраняемых видов в перечень таксонов и популяций, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде.

Артюхов А.И., Федотов Ю.П. Большая белая цапля *Egretta alba* (Linnaeus, 1758) // Красная книга Брянской области. Животные. Брянск, 2004. С. 66-67.

Афанасьев В.Т. Редкие гнездящиеся птицы среднего течения реки Десны // Заповедные территории и охрана биологического разнообразия. Нерусса, 1995. С. 7-10.

Бёме Л.Б., Бёме Р.Л. Материалы к познанию фауны птиц Брянской области (Новозыбковский район) // Ученые записки Новозыбковского государственного педагогического института, 1952. С. 281-306.

Власов А.А., Миронов В.И. Редкие птицы Курской области. Курск, 2008. 126 с.

Грищенко В.Н. Большая белая цапля *Casmerodius albus* (Linnaeus, 1758) // Птицы России и сопредельных регионов: Пеликанообразные, Аистообразные, Фламингообразные. М., 2011. С. 304-329.

Кайгородова Е.Ю. Сведения о редких и охраняемых видах птиц Брянской области в 2007 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 3. Брянск, 2007. С. 67-75.

Кайгородова Е.Ю. Сведения о редких и охраняемых видах птиц Брянской области в 2008 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 4. Брянск, 2008. С. 96-98.

Кайгородова Е.Ю. Сведения о встречах редких и охраняемых видов птиц Брянской области в 2009-2010 годах // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 5. Брянск, 2010. С. 108-110.

Кайгородова Е.Ю., Косенко С.М. Встречи охраняемых видов птиц Брянской области в 2005 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 1. Трубчевск, 2005. С. 221-225.

Кайгородова Е.Ю., Косенко С.М. Встречи редких и охраняемых видов птиц Брянской области в 2011 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 6. Брянск, 2011. С. 116-118.

Кайгородова Е.Ю., Косенко С.М. Встречи редких и охраняемых видов птиц Брянской области в 2012 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 7. Брянск, 2012. С. 12-14.

Кайгородова Е.Ю., Кругликов С.А., Федотов Ю.П. Сведения о редких и охраняемых видах птиц Брянской области в 2006 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 2. Трубчевск, 2006. С. 74-79.

Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю. Встречи охраняемых видов птиц в Неруссо-Деснянском полесье в 2007 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 3. Брянск, 2007. С. 76-80.

Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю. Встречи охраняемых видов птиц в Неруссо-Деснянском полесье в 2008 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 4. Брянск, 2008. С. 99-105.

Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю. Встречи и мониторинг охраняемых видов птиц в Неруссо-Деснянском полесье в 2009 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 5. Брянск, 2010. С. 111-119.

Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю. Встречи и мониторинг охраняемых видов птиц в Неруссо-Деснянском полесье в 2010 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 6. Брянск, 2011. С. 119-128.

Косенко С.М., Кайгородова Е.Ю. Встречи и мониторинг охраняемых видов птиц в Неруссо-Деснянском полесье в 2011 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 7. Брянск, 2012. С. 56-64.

Кругликов С.А. Встречи редких видов птиц в поймах рек Десна и Нерусса в южной части Брянской области в 2008-2010 годах // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 6. Брянск, 2011. С. 129-132.

Кругликов С.А., Горенков О.С., Редкие виды птиц на весеннем перелете в пойме Десны // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 1. Трубчевск, 2005. С. 225-230.

Кудленок И.А. Изменение условий обитания и плотности поселения колониальных околоводных птиц в Брянской области под влиянием деятельности человека // Проблемы охраны природы в нечерноземной зоне в связи с интенсификацией сельскохозяйственного производства. Вып. 3. Брянск, 1983. С. 93-95.

Кузьменко Ю.В., Федотов Ю.П. О некоторых редких видах птиц Брянской области // Орнитология. Вып. 32. М.: МГУ, 2005. С. 132-133.

Лавров М.Т. Животный мир Брянской области. Тула, 1983. 127 с.

Лозов Б.Ю. Новые виды редких гнездящихся птиц Центральной России и Брянской области // Редкие виды птиц Нечерноземного центра России. М., 1998. С. 94-97.

Лозов Б.Ю. Некоторые новые сведения о редких птицах Нечерноземья в пределах Неруссо-Деснянской КОТР // Редкие виды птиц Нечерноземного центра. М., 2008. С. 245-246.

Лозов Б.Ю., Коршунов Е.Н., Коршунова Е.Н., Шпиленок И.П. Фауна редких и уязвимых птиц Неруссо-Деснянского физико-географического раона и проблемы ее сохранения // Редкие и уязвимые виды растений и животных Неруссо-Деснянского физико-географического района. Брянск, 1997. С. 149-214.

Лозов Б.Ю., Шпиленок И.П. Материалы по редким и уязвимым видам птиц Неруссо-Деснянских ландшафтов речных долин // Редкие виды птиц центра Нечерноземья. М., 1990. С. 72-78.

Лушков Р.А., Сулоев А.Т., Прокофьев И.Л. Дополнительные материалы о редких и охраняемых видах птиц Стародубского р-на Брянской области в 2005-2008 гг. // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 4. Брянск, 2008. С. 106-107.

Марголин В.А. Птицы Калужской области. Неворобьиные. Часть I. Калуга, 2000. 242 с.

Методические рекомендации по ведению Красной книги субъекта Российской Федерации. Москва, 2006. 20 с. [Разработка МПР России, направлена для использования в работе письмом Заместителя министра 27.07.2006 г. № 02-12-53/5987]

Миронов В.И. Влияние антропогенных факторов на изменение состава орнитофауны Курской области за последние 100 лет // Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 3. Харьков, 1996. С. 23-25.

Миронов В.И. Редкие птицы Курской области // Редкие виды птиц Нечерноземного центра России. М., 1998. С. 304-306.

Недосекин С.В. Орнитофауна Орловской области и ее исследователи: пособие по краеведению. Орёл, 2013. 132 с.

Никифоров М.Е. Белорусская орнито-фаунистическая комиссия: обзор сообщений о наиболее редких находках за 1990-1999 гг. // Subbuteo. 2001. Т. 4, №1. С. 25-40.

Никифоров М.Е., Самусенко И.Э. Большая белая цапля Egretta alba (Linnaeus, 1758) Вялікая белая чапля // Красная книга Республики Беларусь: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных. Минск: «Беларуская Энцыклапедыя» имени Петруся Бровки, 2006. С. 62-64.

Суслова П.В. Материалы по птицам пограничной полосы лесов в пределах Западной области // Памяти академика М.А. Мензбира. М.-Л., 1937. С. 503-550.

Те Д.Е., Сиденко М.В., Галактионов А.С., Волков С.М. Птицы национального парка «Смоленское Поозерье». Смоленск, 2006. 176 с.

Федосов А.В., Никитин К.Н. Животный мир Брянской области. Материалы к познанию фауны позвоночных. Брянск, «Брянский рабочий», 1951. 88 с.

Федотов Ю.П. Сведения о редких и охраняемых видах птиц Брянской области // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 1. Трубчевск, 2005. С. 230-236.

Шумик А.Н. Встречи охраняемых видов птиц в Брянской области в 2009-2010 гг. // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Брянск, 2010. Вып. 5. С. 144-147.

Шумик А.Н. Встречи охраняемых видов птиц в 2011 году на территории Брянской области // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Вып. 6. Брянск, 2011. С. 150-151.

Шумик А.Н. Встречи редких и охраняемых видов птиц на территории Брянской области в 2012 году // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Материалы по ведению Красной книги Брянской области. Брянск, 2012. Вып. 7. С. 33-35.

Martínez-Vilalta A., Motis A. Family Ardeidae (Herons) // Handbook of the Birds of the World. Vol. 1, Ostriches to Ducks. Barcelona: Lynx Edicions, 1992. P. 376-403.