

ГОЛУБАЯ ЛЕНТА


Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera

Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 2 категория — сокращающийся в численности вид.

Синонимы. Орденская лента голубая, ленточница голубая.



Описание. Крупная бабочка, 90 — 110 мм в размахе крыльев. Передние крылья серые с зигзагообразными поперечными полосками, задние черные с широкой голубой каймой. Тело толстое, опущенное, серого цвета. Гусеница пепельно-серая, на голове дуговидные черные полосы.

Распространение. Ареал охватывает Северную Америку и лесную зону Евразии. Отмечена почти по всей территории Украины, в том числе в зоне Полесья [4]. В России вид широко распространен по лесным территориям (кроме чисто хвойных) европейской части, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока [2].

Распространение в Брянской области. Вероятно, довольно широко распространенный вид лесных р-нов обл. В 1970-е гг. отмечена как обычная бабочка Брянской обл. (без указания конкретных местонахождений) [3]. В 1990 г. голубая лента зарегистрирована в заповеднике «Брянский лес» [5], а также в



окр. Жуковки, д. Добринь (Брянский р-н) и ст. Полужье (Выгоничский р-н) [6]. В 2003 г. вид встречен в памятнике природы «Теребушка» (Суземский р-н) [7]. На сопредельной территории обитает в Черниговском Полесье Украины [4].

Места обитания и образ жизни. Обитает в лиственных и смешанных лесах, лесополосах, парках, плодовых садах. Ночной вид. Даёт одно поколение в год. Лёт бабочек в июле — октябре. Самки откладывают яйца (всего до 900) на кормовые растения в трещины коры деревьев: тополь, ива, клен, ясень, вяз [1], осина, береза, ольха, дуб [4]. Эти же яйца и зимуют. Весной следующего года из них выходят гусеницы, которые кормятся около 48 дней листьями кормовых растений, а в начале июля оккукливаются между листьями деревьев [4]. В конце июля начало лёта бабочек нового поколения.

Численность. Численность на европейской части РФ колеблется от низкой до средней [2]. Современные данные о численности вида в Брянской обл. отсутствуют.

Лимитирующие факторы. Не выяснены.

Принятые меры охраны. Вид внесен в Приложение 3 к Красной книге России, Красную книгу Украины. В Брянской обл. охраняется в заповеднике «Брянский лес».

Рекомендации по сохранению вида. Изучение распространения в обл. и разработка мер по охране вида.

Источники информации: 1. Горностаев, 1998; 2. Приложение 3 к Красной книге РФ, 2001; 3. Редкие... Брянской обл., 1982; 4. Червона книга України, 1994; 5. Шелухо, 1990; 6. Аникович А.Г., устн. сообщ.; 7. Данные автора.

Автор: С.А. Кругликов.

МАЛИНОВАЯ ЛЕНТА

Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)

Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera

Семейство Совки — Noctuidae

Статус. 3 категория — редкий вид.


Синонимы. Орденская лента малиновая или карминовая.



Описание. Бабочка средних размеров, размах крыльев 69 — 80 мм. Передние крылья серо-коричневые с расплывчатыми бело-оранжевыми рисунками. Задние крылья оранжево-красные, с зубчатым черным краем и одноцветной баҳромой. Темная срединная перевязь на задних крыльях образует резкие остроугольные изгибы. Тело толстое. Голова и грудь серо-коричневого, а брюшко светло-коричневого цвета. Гусеница желто-коричневая с более темной верхней частью и двойной желтой продольной полосой на спине. Голова бурая со светлой каймой у основания.

Распространение. Ареал охватывает Северную Африку, Малую Азию, Кавказ, Западную Европу. Вид распространен на Украине, в том числе в зоне Полесья [4]. В России встречается в средней полосе европейской части [3], на юге европейской части и Северном Кавказе [1].

Распространение в Брянской области. Вид встречается в центральных и южных р-нах обл. В 1989 г. отмечен в заповеднике «Брянский лес» [5], а в 1990-х гг. — в окр. Жуковки, д. Добрунь (Брянский р-н) и ст. Полужье (Выгоничский р-н) [6]. На сопредельной территории встречается в Черниговском Полесье Украины [4].



Места обитания и образ жизни. Обитает в дубравах, в смешанных лесах и парках с участием дуба. Ночной вид. Даёт одно поколение в год. Лёт бабочек в июле — сентябре. Самки откладывают яйца в трещины коры дуба. Эти же яйца и зимуют. Весной следующего года из них выходят гусеницы, которые питаются в среднем 24 дня листьями дуба обыкновенного (или каменного) [4]. Окукливание в июне — июле в белых неплотных шелковистых коконах между листьями или в трещинах коры деревьев. В июле начало лёта бабочек нового поколения.

Численность. Везде низкая.