


## КРАСНАЯ КНИГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ



ритории встречается в Украине и Смоленской обл. [2].

**Места обитания и образ жизни.** Представитель небольшого тропического рода. Мигрирующий вид — бабочки нередко совершают далекие перелеты. Предпочитают перелески, лесополосы, кустарники, овраги и аграрный ландшафт. В течение года развивается 2 поколения. Бабочки активны в сумерки и ночью. Самка откладывает яйца на пасленовые растения (картофель, паслен, дурман, белладонна), а также на бересклет и малину [1], иногда на жасмин и сирень [5]. После периода питания гусеницы уходят в почву на глубину 15 — 25 см и оккукливаются. Зимуют куколки, которые чувствительны к холоду и часто погибают, особенно в суровые зимы [5]. В мае — июне следующего года лёт бабочек первого поколения, а в сентябре — октябре — второго поколения. В отличие от большинства других бражников бабочки питаются не нектаром, а вытекающим древесным соком. Иногда забираются в пчелиный улей и высасывают мед [1].

**Численность.** На Украине встречаются единичные экземпляры, хотя до 1940-х гг. вид был довольно обычен [5]. В Брянской обл. редкий, возможно, только залетный вид, так как куколки, как правило, погибают зимой.

**Лимитирующие факторы.** Суровые зимы с глубоким промерзанием почв, применение пестицидов на пасленовых культурах (особенно на картофеле).

**Принятые меры охраны.** Вид занесен в Приложение 3 к Красной книге России и Красную книгу Украины.

**Рекомендации по сохранению вида.** Изучение распространения и особенностей экологии. Разработка мер охраны вида в обл.

**Источники информации:** 1. Горностаев, 1998; 2. Красная книга Смоленской обл., 1997; 3. Приложение 3 к Красной книге РФ, 2001; 4. Редкие...Брянской обл.; 5. Червона книга України, 1994; 6. Шелухо, 1990; 7. Аникович А.Г., устн. сообщ.

**Автор:** С.А. Кругликов.

## МЕДВЕДИЦА-ГОСПОЖА

*Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758)


Отряд Чешуекрылые — Lepidoptera

Семейство Медведицы — Arctiidae

Статус. 3 категория — редкий вид.

Синонимы. Медведица-хозяюшка.

**Описание.** Бабочка средних размеров, размах крыльев 45 — 55 мм. Передние крылья черные, несут 3 крупных белых и 5 — 6 мелких белых пятен. Задние крылья оран-




## НАСЕКОМЫЕ.

жевые с черными разводами по краям. Туловище толстое и мохнатое. Голова и грудь черные, брюшко черное с широкими оранжевыми продольными полосами по бокам. Усики самцов обычно гребневидные.

**Распространение.** Европейско-малоазиатский вид. Ареал охватывает Центральную, Южную и Восточную Европу, Малую Азию, Кавказ и Закавказье. Встречается на Украине, в том числе в Полесье [6]. В России в южной и средней полосе европейской части и на Южном Урале [5].

**Распространение в Брянской области.** Встречается в центральных и юго-западных р-нах. В 1980-е гг. указан для пойменных ландшафтах рр. Ипуть, Судость, Нерусса и Навля [4]. В 1990 г. зарегистрирован в кв. 48 заповедника «Брянский лес» [7]. В 1990-х гг. отмечен в окр. ст. Полужье Выгоничского р-на [8]. На сопредельной территории обитает в Черниговском Полесье Украины [6] и в Смоленской обл. [3].



**Места обитания и образ жизни.** Встречается на опушках и полянах сырых лиственных, смешанных и хвойных лесов, в редколесьях и кустарниках, особенно вдоль ручьев и малых рек. Предпочитает прибрежные оторфованные понижения на

возвышенностях микрорельефа [2]. Дневной вид. Даёт одно поколение в год. Лёт бабочек в июне — июле [6]. Самки откладывают яйца на кормовые растения: крапиву, яснотку, незабудку, жимолость, иву, тополь [1], а также лотик, герань, таволгу, малину, рябину, дубовый подрост [2]. Гусеницы питаются листьями кормовых растений с начала августа до холодов, после чего зимуют в беловатом неплотном коконе на почве среди растительных остатков. Весной следующего года гусеницы выходят из коконов и продолжают питаться до конца мая, после чего оккуливаются. Начало лёта бабочек в июне.

**Численность.** Численность находится на постоянно низком уровне. Бабочки встречаются локально, единичными экземплярами или небольшими колониями по несколько особей. Так, во время пика лета отмечают в среднем 0,5 — 1 экз. на 1 га, изредка 1 — 5 экз. на 1 га [6]. Численность и тенденции её изменения в Брянской обл. неизвестны.

**Лимитирующие факторы.** Уничтожения мест обитания в результате изменения гидрологического режима территорий, а также сенокошение в местах питания гусениц.

**Принятые меры охраны.** Вид занесен в Приложение 3 к Красной книге России, Красную книгу Украины. В Брянской обл. охраняется в заповеднике «Брянский лес».

**Рекомендации по сохранению вида.** Организация ООПТ в местах обитания вида: сохранение участков разнотравных лесных лугов и долин малых рек и ручьев.

**Источники информации:** 1. Горностаев, 1998; 2. Красная книга Московской обл., 1998; 3. Красная книга Смоленской обл., 1997; 4. Лавров и др., 1993; 5. Приложение 3 к Красной книге РФ, 2001; 6. Червона книга України, 1994; 7. Шелухо, 1990; 8. Анискович А.Г., устн. сообщ.

**Автор:** С.А. Кругликов.