Рекомендации по сохранению вида. Выявление и охрана крупных выводковых колоний в человеческих постройках, в том числе ограничение доступа людей и запрет строительных работ в убежищах в период выведения потомства (конец весны—середина лета). Пропаганда позитивного отношения к рукокрылым среди местного населения. Необходимо проведение специальных работ по выяснению распространения и численности двухцветного кожана в Брянской обл. с возможной последующей переоценкой его охранного статуса.

Источники информации: 1. Павлинов и др., 2002; 2. Меландер и др., 1935; 3. Меландер, 1938; 4. Косенко, Лозов, 1999; 5. Глушкова и др., в печати; 6. Бобринский и др., 1965; 7. Сержанин, 1961; 8. Ссавці України..., 1999; 9. Шешурак, Кедров, 1998; 10. Мерзлікін, Лебідь, 1998; 11. Флинт и др., 1965; 12. Стрелков, Ильин, 1990; 13. Бакка, Бакка, 1999.

Авторы: *Е.Ф. Ситникова, А.В. Борисенко.*

МЕДВЕДЬ БУРЫЙ

Ursus arctos Linnaeus, 1758

Отряд Хищные — Carnivora

Семейство Медвежьи — Ursidae

Статус. 1 категория — вид под угрозой исчезновения, изолированная популяция на южной границе ареала.

Описание. Обитающий в области медведь представлен среднерусским подвидом *(U. a. arctos)*. Звери европейской части страны мельче западносибирских этого же подвида. Длина тела до 2,5 м, масса обычно 250 — 300 кг, изредка больше. Самки значительно меньше самцов. Окраска густого грубого меха обычно бурая, варьирует от буровато-палевой до почти черной. Окрас молодых в целом

светлее, чем взрослых. У медвежат, как правило, имеются два хорошо развитых белых пятна на шее и загривке. Часто эти пятна образуют светлый ошейник. Этот ошейник в редких случаях сохраняется у полувзрослых и взрослых животных [1, 2].

Распространение. Ареал охватывает Евразию на север до границы древесной растительности, на юг до Гималаев, Средиземного моря и Северо-Западной Африки; Северная Америка на север почти до северной оконечности материка, на юг до Мексики [2]. В настоящее время значительно сокращенная сплошная часть евразийского ареала находится на территории России; в Европе он представлен мелкими изолированными популяциями в Апеннинской, Балканской, Карпатской, Пиренейско-Кантабрийской и Скандинавской горных системах.

Распространение в Брянской области. В начале XX века медведь был распределен неравномерно по территории обл.: в северо-западных и восточных р-нах был довольно обычен; в центральных и южных р-нах — близок к истреблению [3 — 5]. К концу 1940-х гг. встречался в единичных экземплярах по всей обл., за исключением Брасовского, Севского, Климовского, Клинцовского и Стародубского р-нов [6]. С конца 1950-х гг. в обл. образовалась изолированная и малочисленная популяция бурого медведя, оторванная от основного ареала вида в

Европейской России. Эта популяция состояла из четырех разрозненных территориальных группировок медведя: Мклетнянской, брянско-карачевской, неруссо-деснянской и злынковской. Первая располагалась в Клетнянском лесном массиве (Клетнянский, частично Жуковский, Мглинский, Дубровский и Жирятинский р-ны); вторая — в Брянско-Карачевском лесном массиве (расположенном между Брянском, западной границей обл., Карачевом, рр. Ревна и Десна); третья — в Неруссо-Деснянском лесном массиве (Суземский, часть Трубчевского, Комаричского, Брасовского и Навлинского р-нов) и четвертая — в Злынковском лесном массиве (Злынковский, часть Новозыбковского и Климовского р-нов). Мигрирующие звери отмечались в Дятьковском р-не [7 — 10]. К настоящему времени сохранились две группировки — клетнянская и неруссо-деснянская, где медведь обитает постоянно. В Брянско-Карачевском и Злынковском лесных массивах регулярно регистрируются мигрирующие звери. Кроме того, мигрирующие (кочующие) особи отмечены: в Красногорском, Клинцовском (в северо-западной части), Дятьковском (Бытошское охотхоз-во) и Рогнединском (в северной правобережной части) р-нах [10, 11].

На сопредельной территории в Гомельской обл. Белоруссии регистрировались только проходящие звери. Малочисленная постоянная группировка медведя сохранилась в Хотимском р-не Могилевской обл. Основная часть популяции медведя в Белоруссии обитает в Витебской обл. (бабиновичская и др. группировки) и в Минской обл. (березинская группировка) [12, 13]. Предположительно между клетнянской группировкой медведя в Брянской обл. и березинской и бабиновичской — в Белоруссии идет постоянный обмен особями [10]. В Смоленской обл. медведь населяет лишь северные р-ны, примыкающие к Тверской обл. [14, 15]. Возможно, между этой и клетнянской популяцией медведь совершает переходы, через Ельницкий (Смоленской обл.) и Рогнединский р-ны, где отмечались мигрирующие особи [8, 10]. В Калужской обл. в конце 1980-х гг. регистрировались единичные звери в соседних с Брянской обл. р-нах — Думиничском, Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском. В Орловской обл. последние встречи медведя были в 1960-х гг. в соседнем Хотынецком р-не [8, 14].

Места обитания и образ жизни. Бурый медведь довольно пластичный вид и может использовать практически все имеющиеся в данном массиве биотопы. В европейской части России для медведя важно наличие более или менее крупных лесных массивов [2, 16]. Например, в заповеднике «Брянский лес» медведь предпочитает сосняки — черничники, неморальные березняки и осинники, сосново-дубовые леса, где сосредоточены основные запасы кормов. Кроме того, он посещает ольшаники, разнотравные сосняки, небольшие лесные поляны с широкотравьем, зарастающие вырубки и верховые болота [17]. Одиночные медведи и самки с медвежатами имеют индивидуальные участки, размер которых

колеблется в среднем от 15 до 30 кв. км [16]. Для зимнего сна устраивает берлогу. В заповеднике «берложными» местами являются поймы лесных речек с буграми и верховые болота с островами леса. Чаще всего медведь активен в сумерки и ночью, в осенний период активен и днем. В области зверь очень осторожен, редко попадается на глаза человеку, не агрессивен. Выход из берлог — конец марта — апрель. Время ухода на берлоги — середина — конец ноября — начало декабря [17]. Медведь всеяден. Основу питания составляют растительные корма — плоды, ягоды, корневища, зеленые части растений. В летне-осенний период нажировочными кормами служат лещина, желуди, различные ягоды, овес. Из животных кормов поедает личинок различных насекомых, мышевидных грызунов, падаль; изредка может добывать копытных. Спаривание происходит в мае — июне. Медвежата родятся в берлоге в январе — феврале. В помете обычно 1 — 2 детеныша, редко бывает до 5. Лактация 4 — 5 месяцев. Самки приступают к размножению на 4 — 5-м году жизни, самцы — на 5 — 7-й год. Половозрелые самки приносят приплод через 1 — 2 года, т. к. медвежата отделяются от матери на 2 — 3-й год жизни [2, 16, 17].

Численность. В 1930-х гг. общая численность медведя оценивалась в 60 — 65 особей [4, 5, 8]. К концу 1940-х гг. численность составляла 46 медведей, а средняя плотность — 0,08 особей/1000 га леса [6]. В 1958 г. в области введен запрет на добычу бурого медведя, до этого охота на него разрешалась круглогодично. Несмотря на запрет, численность вида продолжала снижаться. Так, к 1970 г. насчитывалось 42 особи, причем большая часть (31 особь) в клетнянской группировке [8], в 1975 г. — уже 32 особи, из них в Клетнянском лесном массиве — 20 особей [9, 18, 19]. По данным ряда авторов [14, 15, 20], численность медведя в обл. в 1980-е гг. не превышала 10 особей. Возможно, эта оценка несколько занижена. В последнее десятилетие (1990—2000-е гг.) отмечается незначительный рост численности бурого медведя. Для поддержания неруссо-деснянской группировки с 1996 по 2002 гг. на территорию заповедника вселено 14 медвежат. В 2003 г. численность медведя в обл. оценена в 45 — 50 особей, из них в Неруссо-Деснянском лесном массиве обитает 20 — 25, в Клетнянском — 10 — 15 особей. Остальные 5 — 10 особей — мигрирующие или кочующие по территории области [11, 21]. В Белоруссии (в березинской и бабиновичской популяциях) численность медведя не превышает 65 — 75 особей [13]. На конец 1980-х гг. численность в Смоленской обл. оценивалась в 150—200 особей; в Калужской — в 3 — 8 особей [8, 14, 20].

Лимитирующие факторы. Природные факторы — низкая воспроизводственная способность, высокая смертность молодняка, поздние сроки вступления в период размножения. Основные причины снижения численности вида: исчезновение крупных лесных массивов, осушение верховых болот, возросший фактор беспокойства и браконьерство. В изолированных популяциях — близкородственное скрещивание (инбридинг).

Принятые меры охраны. Внесен в Красную книгу Белоруссии (2 категория). Охраняется Бернской конвенцией (Приложение 2) и Конвенцией СИТЕС (Приложение 2). Территориальная охрана: заповедник «Брянский лес» и заказник «Клетнянский». С 1996 г. в заповеднике реализуется программа по восстановлению численности бурого медведя в неруссо-деснянской группировке путем подселения медвежат-сирот.

Рекомендации по сохранению вида. Разработка совместной с соседними регионами программы по сохранению бурого медведя. Борьба с браконьерством. Усиление охранного режима Клетнянского заказника. Продолжение программы по поддержанию популяции бурого медведя в Неруссо-Деснянском лесном массиве и ее расширение на территорию Клетнянского лесного массива. Пропаганда сохранения вида среди населения.

Источники информации. 1. Павлинов, 2002; 2. Гептнер и др., 1967; 3. Горбачев, 1915; 4. Юргенсон, 1931; 5. Граве, 1933; 6. Федосов, Никитин, 1951; 7. Приклонский, 1967; 8. Лавров, 1975; 9. Ватолин, 1979; 10. Ситникова, неопубл. данные; 11. Материалы анкетирования, 2003; 12. Сержанин, 1961; 13. Козло, 1993; 14. Лобачев и др., 1991; 15. Пажетнов, 1993; 16. Пажетнов, 1990; 17. Ситникова, 2002 б; 18. Полякова, 1975; 19. Редкие...,1982; 20. Вайсфельд, 1991; 21. Ситникова, 2002 а.

Автор: *Е.Ф. Ситникова.*

БАРСУК

Meles meles (Linnaeus, 1758)

Отряд Хищные — Carnivora

Семейство Куницевые — Mustelidae

Статус. 2 категория — уязвимый вид с сокращающейся численностью.

Описание. Крупный представитель семейства куньих. Длина тела до 90 см, масса от 7 до 24 кг. Тело массивное, приземистое, клиновидной формы. Голова клинообразная. Ушные раковины маленькие, округлые. Хвост короткий. Окраска меха светло-серебристо-серая наверху, черная снизу. Голова белая, с каждой стороны — резко выделяющаяся на этом фоне проходящая через глаз и ухо черная полоса; расширяясь и становясь боле размытой, она протягивается до середины шеи. Зимний мех на спине и боках высокий, грубый; брюхо покрыто короткими и редкими волосами [1, 2].

Распространение. Европа, Кавказ, южная и средняя полоса Сибири, Передняя, Центральная и Средняя Азия, юг Дальнего Востока, Китай, Корея, Япония [1].

Распространение в Брянской области. В начале XX столетия барсук обитал на всей территории Брянской обл. [3–5], но к концу 40-х гг. повсюду стал довольно редок [6]. До настоящего времени ареал барсука не претерпел существенных изменений. Зверь встречается в 24 районах обл., за исключением Брянского, Погарского и Красногорского. Наибольшее число поселений барсука известно в Дятьковском, Рогнединском, Выгоничском, Суражском, Злынковском, Новозыбковском, Климовском, Комаричском, Навлинском, Суземском и