

ном, или на зимовках. В европейской части России совершает сезонные миграции. Зимует в дуплах и постройках, вероятно, на Северном Кавказе. [6, 8, 13].

**Численность.** Данных по численности вида в обл. нет. Возможно, степень угрожаемости этого вида завышена ввиду низкой встречаемости. В Белорусском Полесье редка. Численность популяции на Украине оценивается не более чем в 600 особей [8, 10].

**Лимитирующие факторы.** Малая вечерница мало уязвима для прямого уничтожения. Основную угрозу может представлять антропогенное или естественное изменение структуры лесных формаций и кормовых местообитаний. Также негативно может сказываться сокращение числа дуплистых деревьев, применение ядохимикатов, изменение состава и динамики численности кормовых видов насекомых.

**Принятые меры охраны.** Вид внесен в Красные книги Белоруссии и Украины (3 категория). Статус МСОП: «LR: nt». Охраняется Бернской конвенцией (Приложение 2). Территориальная охрана: заповедник «Брянский лес».

**Рекомендации по сохранению вида.** Необходимы специальные исследования по уточнению статуса малой вечерницы в Брянской области, выявление выводковых и транзитных убежищ. Ограничение санитарных и прочих лесотехнических мероприятий в широколиственных массивах. Возможно развешивание искусственных убежищ. В специальных мерах по предотвращению прямого уничтожения, видимо, нет необходимости.

**Источники информации:** 1. Павлинов и др., 2002; 2. Меландер и др., 1935; 3. Меландер, 1938; 4. Станчинский, 1926; 5. Глушкова и др., в печати; 6. Флинт и др., 1965; 7. Крочко, 1994; 8. Ссавці України..., 1999; 9. Мерзлікін, Лебідь, 1998; 10.

Сержанин, 1961; 11. Панютин, 1970; 12. Лихачев, 1980; 13. Редкие и исчезающие растения и животные Украины, 1988.

**Авторы:** Е.Ф. Ситникова,  
А.В. Борисенко.

## ВЕЧЕРНИЦА ГИГАНТСКАЯ

*Nyctalus lasiopterus* (Schreber, 1780)

**Отряд** Рукокрылые — Chiroptera

**Семейство** Гладконосые —  
Vespertilionidae

**Статус.** 3 категория — редкий вид, спорадически распространенный на значительной территории, малоуязвимый для прямого уничтожения.



**Описание.** Самая крупная летучая мышь России. Длина тела 84–104 мм, масса 41–76 г, длина предплечья 63–69 мм, размах крыльев 41–46 см. Ушные раковины округлые (а не треугольные, как у других видов вечерниц), очень широкие. Крылья большие, узкие; в полете, как правило, отчетливо заметна относительно длинная шея. Шерсть густая и шелковистая, средней длины. Окраска верхней стороны тела каштаново-коричневая, нижняя сторона немного светлее.

**Распространение.** Лиственные леса и лесостепная зона Европы от Северной Франции до Оренбургской обл., на юг



— до Закавказья, Ирана, Марокко. В России расположена северо-восточная часть ареала [1].

**Распространение в Брянской области.**

Существует единственное упоминание о встрече этого вида в Брянской обл. (Трубчевский р-н). В апреле 1983 г. в долине Неруссы (урочище «Конские болота», кв. 112–113 нынешней территории заповедника «Брянский лес») найдена погибшая особь [2]. В июле 2003 г. во время рекогносцировочного обследования фауны летучих мышей Неруссо-Деснянского Полесья на кордоне Старое Ямное (кв. 108 заповедника) с близкого расстояния наблюдали очень крупную летучую мышь, предположительно этого вида [3]. Возможно, обитает в Смоленской обл. [4]. На Украине основные находки сделаны в центральных и восточных обл. В 1993 г. в Сумской обл. зарегистрирована одна, видимо, кочующая особь [5, 6].

**Места обитания и образ жизни.** Образ жизни малоизучен. На территории России основная масса находок приурочена к широколиственным и смешанным лесам; в лесостепной зоне — к лесным колкам и речным долинам. В России летние убежища найдены только в дуплах лиственных деревьев. Как правило, гигантских

вечерниц обнаруживают в колониях других видов летучих мышей — рыжей или малой вечерниц, нетопырей, ушанов. Самостоятельные колонии находят редко; самое крупное найденное скопление — 35 особей. Вылетает на охоту сразу после захода солнца. Охотится на большой высоте над кронами деревьев и открытыми пространствами, нередко совместно с рыжими вечерницами. Пищей, вероятно, служат крупные летающие жесткокрылые и ночные чешуекрылые. Размножение практически не изучено. Взрослые самцы найдены только в южных областях России. Роды происходят в июне, в выводке, по-видимому, обычно 1 детеныш. Перелетный вид; транзитные особи встречены в Нижнем Поволжье и Ростовской обл. Точные места зимовок неизвестны. [1, 7–10].

**Численность.** Численность в обл. неизвестна. Гигантские вечерницы повсюду редки и встречаются спорадически. В России в конце XX века численность приблизительно оценивалась в 17–27 тыс. особей при плотности примерно 1 особь/10 кв. км пригодной для обитания территории [11].

**Лимитирующие факторы.** Благодаря низкой встречаемости гигантская вечерница мало уязвима для прямого уничтожения. Основную угрозу представляет, по-видимому, исчезновение зрелых широколиственных лесов вследствие как лесотехнических мероприятий, так и естественной сукцессии. Также негативно может сказываться сокращение количества дуплистых деревьев, применение ядохимикатов, изменение состава и динамики численности кормовых видов насекомых.

**Принятые меры охраны.** Вид внесен в Красную книгу России (3 категория), Украины (3 категория) и Белоруссии. Статус МСОП: «LR: nt». Охраняется Бернской конвенцией (Приложение 2). Терри-

ториальная охрана: Черноморский заповедник (Украина), заповедник «Брянский лес», Воронежский, Волжско-Камский, Окский, Кавказский и, возможно, другие заповедники европейской части РФ.

**Рекомендации по сохранению вида.** Сохранение зрелых широколиственных лесов, в т.ч. ограничение санитарных рубок. Выявление и охрана кормовых угодий, ключевых летних и транзитных местообитаний. Пропаганда среди населения необходимости сохранения рукокрылых и их убежищ. Специальных мер охраны по предотвращению прямого уничтожения не требуется.

**Источники информации:** 1. Кузякин, 1980; 2. Шпиленок и др., 1997; 3. Глушкова и др., в печати; 4. Красная книга Смоленской обл., 1997; 5. Крочко, 1994а; 6. Савви України..., 1999; 7. Стрелков, 1977; 8. Стрелков, Ильин, 1990; 9. Ильин и др., 2002; 10. Панютин, Крусков, 2000; 11. Панютин, 1983.

**Авторы:** Е.Ф. Ситникова,  
А.В. Борисенко.

## НЕТОПЫРЬ-КАРЛИК

*Pipistrellus pipistrellus* Schreber, 1774

Отряд Рукокрылые — Chiroptera

Семейство Гладконосые —  
Vespertilionidae

**Статус.** 3 (4) категория — малоизученный вид. Таксономическая принадлежность и характер пребывания в обл. требуют уточнения. В настоящее время в Западной Европе вид *P. pipistrellus* разделен на 2 самостоятельных вида: нетопырь-карлик *P. pipistrellus* и малый нетопырь *P. rufus* [1]. Вопрос о таксономической принадлежности мелких нетопырей на территории России пока не изучен. Возможно, в обл. обитают оба вида [2].



**Описание.** Мелкая летучая мышь. Длина тела 32 — 51 мм, масса 3 — 6 г, длина предплечья 28 — 34 мм, размах крыльев 18 — 22 см. Уши короткие, к вершине сужаются и закругляются. мех густой, сравнительно короткий. Окраска спины от коричневой и коричнево-рыжей до серо-палевой. Брюхо немного светлее спины. От совместно обитающего лесного нетопыря (*Pipistrellus nathusii*) отличается более мелкими размерами и некоторыми деталями строения; от морфологически близкого малого нетопыря внешне почти неотличим.

**Распространение.** Населяет Европу (кроме севера), Юго-Западную, Южную и Среднюю Азию, Казахстан, Северо-Западную Африку; в России — Северный Кавказ, возможно, также центральные и южные области европейской части [3].

**Распространение в Брянской области.** В начале XX века нетопырь-карлика считали обычным видом на территории обл. [4, 5, 6]. В 2001 г. отмечен на кордоне Вилы (кв. 40 заповедника «Брянский лес», Трубчевский р-н) [7]. Вероятно, эти находки относятся к систематически близкому малому нетопырю, которого до конца XX века объединяли с нетопырем-карликом в один вид. Летом 2003 г. в ходе специального обследования фауны летучих мышей Неруссо-Деснянского Поле-