

КРАСНАЯ КНИГА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Федотов, Евстигнеев, 1997; 7. Федотов, Евстигнеев, 1999; 8. Хитрово, 1907; 9. Хитрово, 1925; 10. Антыков, Гроздов, 1958; 11. Гербарий Харитонцева, БГОКМ; 12. Гербарий Гроздова, БГОКМ; 13. Данные авторов очерка; 14. Харитонцев, 1986 б; 15. Гербарий заповедника «Брянский лес».

Рисунок: Губанов и др., 2002.

Авторы: О.И. Евстигнеев,
Ю.П. Федотов.

ОЧЕРЕТНИК БЕЛЫЙ

Rhynchospora alba (L.) Vahl

Семейство Осоковые — *Cyperaceae*


Статус. 1-я категория. Вид, находящийся под угрозой исчезновения.



Описание. Травянистый короткокорневищный многолетник. Образует рыхлые дерновины. Стебли тонкие, трехгранные, высотой 10—40 см. Листья линейные, почти щетиновидные, желобчатые, шириной 1—2 мм. Соцветие состоит из одного верхушечного или 2—8 расставленных беловатых колосков. Плод — сплюснутый обратнояйцевидный орешек с носиком.

Биология и экология. Цветет в июне. Размножается преимущественно семенами. Обитает в условиях от сыролесолугового до водного типов увлажнений. Растет на кислых почвах с бедным содержанием минерального азота. Диапазон освещенности — открытые и полуоткрытые пространства. Криптофит (гелофит).

Распространение. Ср. В-TEMP. В Брянской обл. — на южной границе ареала. Отмечен в 3 р-нах. Брянский р-н: оз. Круглое в пределах Фокинского л-ва [1, 6, 7—10]. Суземский р-н: Стеклянское л-во — кв. 47 [3—5, 11]. Без указания



конкретных местонахождений отмечался в Дятьковском р-не [2].

Ландшафты. Болва-Деснянский и Неруссо-Деснянский фг. р-ны: обводненные сплавинные болота в пределах моренно-зандровых местностей.

Сообщества. Травяно-сфагновые болота, относящиеся к ассоциации *Caricetum limosae* Osvald 1923, где растет вместе с *Carex limosa* L., *C. rostrata* Stokes, *Drosera rotundifolia* L., *Eriophorum vaginatum* L., *Menyanthes trifoliata* L., *Scheuchzeria palustris* L. и др. [4].

Численность и тенденции ее изменения. В обл. известно 3 места нахождения,

в том числе в Неруско-Деснянском фг. р-не — 1. В Стеклянском л-ве популяция представлена многочисленными особями на площади 200 м² [3]. Состояние остальных популяций неизвестно.

Лимитирующие факторы. Уязвимый вид на границе ареала. Разрушение болотных экосистем: осушительная мелиорация и торфоразработки.

Принятые меры охраны. Территориальная охрана: заказник «Озеро Круглое».

Рекомендации по сохранению. Соблюдение режима заказника «Озеро Круглое» [9]. Охрана обводненных переходных и верховых болот. Организация ботанического памятника природы в Стеклянском л-ве (кв. 47). Поиск новых местообитаний и организация их охраны в комплексе с другими редкими видами. Контроль состояния популяций на ООПТ.

Источники информации: 1. Босек, 1975; 2. Булохов, Величкин, 1998; 3. Евстигнеев, Федотов, 2000; 4. Федотов, 1999; 5. Федотов, Евстигнеев, 1997; 6. Антыков, Гроздов, 1958; 7. Гербарий Харитонцева, БГОКМ; 8. Гербарий Харитонцева, MW; 9. Харитонцев, 1986 б; 10. Гроздов, 1961 б; 11. Гербарий заповедника «Брянский лес».

Рисунок: Определитель ..., 1987.

Авторы: О.И. Евстигнеев,
Ю.П. Федотов.

ЛИЛИЯ САРАНКА

Lilium martagon L.

Семейство Лилейные — *Liliaceae*

Статус. 3-я категория. Редкий вид.

Описание. Травянистый луковичный многолетник. Луковица до 10 см в диаметре, яйцевидной формы, не очень плотная, состоит из донца конической формы



и спирально расположенных на нем сочных чешуй. Стебель 80–150 см высоты, олиственний. Листья короткочерешковые или сидячие, в средней части стебля собраны в мутовки, в верхней части стебля очередные. Соцветие кистевидной формы из 3–17 цветков. Цветки поникающие, сиреневые или розово-сиреневые, с темно-пурпурными пятнышками. Плод — шестигранная коробочка.

Биология и экология. Цветет в июне–июле. Размножается семенами и вегетативно — луковичками-детками, которые формируются на стеблевых корнях под землей. При высокой сомкнутости крон не цветет. Обитает в условиях от влажно-степного до сыролесолугового типов увлажнений. Растет на кислых — слабощелочных почвах с очень бедным и богатым содержанием минерального азота. Диапазон освещенности — от открытых пространств до тенистых лесов. Криптофит (геофит).

Распространение. Ев-Аз. В-Темр. В Брянской обл. отмечен в 15 р-нах. Брасовский р-н: Крупецкое л-во — кв. 24, 40, 42, 47, 53, 55, 58, 65 [5, 13, 24]; окр. д. Фоменок [15]; окр. с. Радогощь [5]; Погребское л-во — кв. 11, 20, 37, 62, 63, 106, 131, 132, 135, 136, 140, 163, 170, 173 [5, 7, 13, 24]. Брянский р-н: лес у Фокинского л-ва [12]; окр. с. Глинищево [21]. Выгоничский р-н: Выгоничское л-во — кв.